

암브록솔염산염

■ 성분·함량 1정 중

암브록솔염산염(BP) 20mg

■ 성상 : 흰색의 원형 트로키제

■ 효능·효과

급성 인후(목구멍)염의 통증 완화

■ 용법·용량

성인 및 12세 이상의 어린이 : 1회 1정씩 3회 복용하십시오. 하루 최대 6정을 초과하지 마십시오. 이 약은 3일을 초과하여 투여하지 마십시오. 지속적인 어떤 증후나 고열이 발생할 경우, 환자는 의사와 상의해야 합니다. 12세 미만의 어린이에게 투여해서는 안됩니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 환자
- 2) 과당 불내성의 유전적 소인을 가진 환자
- 3) 12세 미만의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 중증(심한 증상) 신장애(신장장애) 환자
- 2) 일부 : 이 약은 태반장벽을 통과합니다. 전임산시험 뿐만 아니라 임신 28주후의 임상 경험에서도 임신중에 약영향의 증거는 보이지 않았으나 이 약은 임신 중에 투여가 권장되지 않습니다.(특히, 임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않습니다.)
- 3) 수유부 : 이 약은 모유로 이행하므로 수유중인 여성은 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 4) 고령자(노인) : 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의하십시오.
- 5) 만성적으로 점액 생성 또는 배출 능력이 손상된 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약과 같은 점액용해제 복용과 관련하여 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사증후군(toxic epidermal necrolysis; TEN) 같은 심각한 피부 손상이 매우 드물게 보고되었습니다. 이 약 복용중 새로운 피부/점막 손상이 나타나면 즉시 복용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 합니다.
- 2) 소화기계 : 때때로 소화불량, 구역, 구토, 가슴쓰림, 인후(목구멍)건조 및 구강(입안)건조를 포함하는 경미한(가벼운) 상부 위장관계 이상반응, 드물게 위부불쾌감, 위·복부(배부분)팽만감, 위·복통(배아픔), 설사, 변비, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 과민증 : 드물게 피부 발진과 같은 알러지 반응과 중증(심한 증상)의 급성 아나필락시스양 반응(아나필락시스 속 포함)이 보고되었으며, 두드러기, 두드러기양 홍반(붉은 반점), 맥관부종(혈관부종), 가려움, 안면종창(얼굴부기), 호흡 곤란, 오한(춥고 떨리는 증상)을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 호흡기계 : 백혈구증가를 수반하는 화농성 비염(코염)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 신경계 : 때때로 혀의 감각이상, 미각 변화가 보고되었으며, 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있습니다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 에리트로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세퓨록시, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여(함께 복용)시 기관지폐 분비물과 객담(가래)에서 항생물질의 농도를 증가시킵니다.
- 2) 코데인 또는 덱스트로메토르판 등의 중추에 작용하는 진해제는 함께 복용하지 않아야 합니다. 기침 반사를 억제하는 경우, 객담된 점액의 축적을 유발하여 기관지 경련이나 기도 감염의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 3) 이 약이 운전 및 기계조작에 영향을 미친다는 증거는 없다. 운전 및 기계조작에 미치는 영향에 대하여 수행된 연구는 없습니다.

■ 저장방법 : 기밀봉기, 실온보관(1~30℃)

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 제조회사 : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동)



생명과학 연구중심 제약기업

테라젠이텍스

경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58

- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.