

아연결핍시 아연보충제

라이트링크

시럽

(황산아연일수화물)

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
전 문 의 약 품
분류번호 : 322

- 성분・함량 : 100mL 중
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 황산아연일수화물(USP) | 552.2mg(아연으로서 200mg) |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) | 8.55mg |
| 파라옥시벤조산프로필(KP) | 0.95mg |
- 성상 : 알루미늄포에 든 투명 혹은 미황색의 점성이 있는 액
- 효능・효과
- 아연이 결핍된 급성 설사에 경구수액제와 병용
- 용법・용량
- 생후 6개월 ~ 5세 어린이는 아연으로서 20mg을 1일 3회로 나누어 10~14일간 복용한다.
- 사용상 주의사항
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 심장・순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 이상반응
 - 이 약의 투여에 의하여 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역질, 저혈압, 폐부종, 구토 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 기타 복통, 소화불량, 설사, 위자극, 위염, 과민성, 두통, 기면 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 일반적 주의
 - 정해진 용법・용량을 잘 지킨다.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도・감독하에 투여한다.
 - 복용시 의사, 약사와 상의하여 복용한다.
 - 상호작용
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 이 약을 투여할 경우에는 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제와 병용투여하지 않는다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중 또는 복용전후에는 피하도록 한다.
 - 과량투여시의 처치
 - 황산아연을 경구로 과량투여 시(30~44그램) 나타나는 증상으로 치사에 이를 수도 있다. 이 증상에는 구역, 구토, 탈수, 전해질불균형, 현기증, 복통, 기면 및 협조운동실조가 포함된다. 1~2mg/kg의 아연을 성인 백혈병 환자에게 1회 정맥투여 시 독성증상의 발현은 나타나지 않았다. 아연의 정상 혈장 농도는 약 88~112 μ g/100mL이고, 독성증상을 일으키는 혈장 중 아연농도는 알려져 있지 않다. 칼슘 보충은 아연의 독성에 대해 예방효과가 있다고 알려져 있다.
 - 황산아연을 과량투여 시 부식성이 있으며, 입과 위장의 점막에 부식 및 염종의 증상을 나타낸다. 위궤양은 천공을 일으킬 수 있으며, 위세척 및 구토는 피해야 한다. 우유 같은 완화제를 사용할 수 있으며, 칼슘에데트산나트륨과 같은 킬레이트화제를 사용할 수 있다.
 - 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오・남용을 피하고, 품질을 보호・유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.
- 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기간 : 제조일로부터 24개월
- 포장단위 : 5mL X 자사포장단위
- 제조자 : (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동)

판매자 : (주)라이트팜텍

서울특별시 구로구 디지털로31길 41
E&C 드림타워 6차 811

- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질・변태・오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7110이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일: 2013. 12. 27
LZY01-131227-00