

써모펜에스정

【원료약품의 분량】1정 중

아세트아미노펜 (K.P).....	200.0mg
에페드린염산염 (K.P).....	15.0mg
카페인무수물 (K.P).....	40.0mg
첨가제 (타르색소).....	청색 1호, 황색 4호

【성상】연한 연두색의 원형 정제

【용법·용량】성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

【효능·효과】감기의 증상상(인후통(목구멍통), 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨스제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소(젖당분해효소) 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해거담제(기침을 그치게하는 기래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 열미약, 알레르기용약)

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3 개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만 의 영·유아(갓난아기·유아)는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영·유아(갓난아기·유아)에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(알레르기성코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환(콩팥질환), 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스)과민성 쇼크 : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 피부점막인중후군(스티븐스-존슨중후군),중독성피부괴사증후군 (리얼중후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.
- 3) 천식
 - ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오. 3) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 4) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】자사포장단위

* 주의

1. 의약품은 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오. 2. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담없는전화 080-729-5800 에서 확인할 수 있습니다.

* 설명서 작성년월일 : 2012. 07. 31.



드림파마

경기도 화성시 향남읍 가리왕로 36