

일반의약품
조제용

알게론정 500mg (알마게이트)

Dongkook
Pharmaceutical

일반의약품
조제용

알게론정 500mg (알마게이트)

006703-008

[원료약품 및 그 분량] 1정 중,
• 유효성분: 알마게이트(별규) 500mg
• 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량]

성인 및 12세 이상의 소아:
알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
 - 2) 알츠하이머병 환자
 - 3) 치질 환자
 - 4) 체액 저류(부기) 환자
 - 5) 임신 중독증 환자
 - 6) 설사 환자
 - 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로로프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용한다.
(2) 살리실산염: 신장의 배설을 증가시킨다.
 - 2) 신장에 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.
 - 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄이온 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈 중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.
- 고령자
- 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
 - 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 30정/병, 500정/병

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※첨부분문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎ 080-777-5678(수신자 요금 부담)로 문의주십시오.

※부작용 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

• 제조원: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

설명서 최종 개정 연월일: 2024. 05. 22

Dongkook 동국제약