Dongkook Pharmaceutical

일반의약품
조 제 용

# 알게론정 500mg
(알마게이트)

500정/병

006704-008

**[원료약품 및 그 분량]** 1정 중, ▪**유효성분**: 알마게이트(KP)…… 500.0mg ▪**첨가제(동물유래성분)**: 유당수화물(소·우유유) ▪**기타첨가제**: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소 **[성상]** 흰색의 타원형 정제 **[효능·효과]** 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림 **[용법·용량]** 성인 및 12세 이상의 소아: 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다. **[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.** 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류(고인,붕임)(부기) 환자 5) 심신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. **2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.** 테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음) **3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.** 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다. (1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다. (2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다. 2) 신장애(신장장애) 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애(신장장애) 환자에게는 권고되지 않는다. 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음. 4) 고령자 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 **4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.** 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 **5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. **6. 저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. **[포장단위]** 500정/병 **[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효) 기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다. ※제품에 관한 의문사항은 동국제약㈜ 소비자상담실(☎080-550-7575: 수신자 요금 부담)로 문의주십시오. ※부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

최종 개정 연월일 : 2026.07.07

▪제조의뢰자:**동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
▪제조자:**오스템파마주식회사** 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 265

플라스틱
HDPE
뚜껑 : LDPE

50x20mm

(01)08806534026729