



주 · 야간의 맞춤형 종합감기약

콜드디앤엔

연질캡슐

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

(주간용)아세트아미노펜(KP)	200.00mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	8.00mg
수도에페드린염산염(USP)	15.00mg
구아이페네신(KP)	41.00mg
(야간용)아세트아미노펜(KP)	200.00mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	8.00mg
수도에페드린염산염(USP)	15.00mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
구아이페네신(KP)	41.00mg

【성 상】

주간용 : 무색 내지 미색의 투명한 내용물을 함유한 투명한 장방형 연질캡슐

야간용 : 무색 내지 연한 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】

감기의 증상상(여러증상)콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】

· 주간용:투명연질캡슐

만8세 이상~만 15세 미만 : 1일 2회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용
만15세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용하십시오.

· 야간용:적색투명연질캡슐

주간용을 복용한지 6시간 경과한 후 다음 용량을 복용
만8세 이상~만 15세 미만 : 1일 1회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용
만15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용 하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을) 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오 : 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구(복용)제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구도를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3 개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침한 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진 · 발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕 부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진 · 발적(출혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
 - ③ 천식
 - ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜주십시오.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시켜 주십시오.
 - 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
 - 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기한】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 외부포장에 표기

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질,변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드림. 공정거래위원회고시 “소비자 분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

※이 약은 안전용기 제품입니다. 절취선을 따라 자른 후 화살표 방향으로 떼어내십시오.

제조의뢰자 :  신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

제조사 : (주)알피코프
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7



설명서 작성년월일 : 2012.09.12