

급·만성 기관지염

글로피진 정

레보드로프로피진

■ 성분 및 분량 : 1 정 중

레보드로프로피진 (EP)60mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)

■ 성 상 : 흰색 원형 정제

■ 효능·효과

다음 질환에서의 기침 : 급·만성 기관지염

■ 용법·용량

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구 투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의하며, 특히 알코올과 병용시 작용이 증대될 수 있습니다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않습니다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

■ 사용(유효)기간 : 제조일로 부터 36 개월

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

■ 포장 단위 : 자사포장단위

■ 제조자 : 위더스제약(주) 경기도 안성시 미양면 제2공단길 2길 103

※ 본 의약품은 우수 의약품제조관리기준을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다.
(소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 설명서 작성된 이후의 변경내용은 당사 홈페이지 www.globalpharm.co.kr 의 각 제품란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

----- 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다. -----

작성일자 2012년 10월 05일

제조의회사



(주) 한국글로벌제약

www.globalpharm.co.kr

충남 서천군 중천면 중천공단32번길 26