

원 생약 그대로 담은 양한방 감기약

# 京南 보감랑 코프엑

## 일반의약품

분류번호: 114

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

### ● 원료약품 및 그 분량 : 1회 용량(100mL) 중

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 감초(KP)            | 0.333g |
| 경미(생규)            | 1.66g  |
| 대추(KP)            | 0.498g |
| 맥문동(KP)           | 1.332g |
| 반하(KP)            | 0.832g |
| 인삼(KP)            | 0.333g |
| 아세트아미노펜(KP)       | 200mg  |
| 티페피딘하이드로클로라이드(KP) | 12.5mg |
| 침가제(보존제) : 벤조산나트륨 | 45mg   |

### ● 성상

진한 갈색의 액체가 든 파우치

### ● 효능·효과

감기의 증상(여러 증상)인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### ● 용법·용량

보통 성인(만 15세 이상) 1회 1포(1회 용량)를 1일 3회, 식후 30분에 복용한다. 필요한 경우는 취침시에 복용하고, 복용간격은 4시간으로 한다.

### ● 사용상의 주의사항

#### 1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

#### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

#### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을) 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

#### 4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)코약(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기약

#### 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 3) 지금까지 약에 약해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 위십이지장궤양, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 5) 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

#### 6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 (상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것)

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우  
① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.  
② 피부접촉만중후군(스티븐스-존슨중후군, 중독성표피괴사증후군(리델중후군)): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈접막에 나타날 수 있다.  
③ 천식  
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있다.  
⑤ 간질성폐렴: 헛기침(가래를 동반하지 않는 기침)을 동반하고, 숨이 차고, 호흡 곤란, 발열 등이 나타날 수 있다(이러한 증상은 감기의 제증과 구별하기 어려울 수 있다. 헛기침, 발열 등의 증상이 악화되는 경우 복용을 중지하고, 의사의 진료를 받도록 한다).  
⑥ 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈당혈액)의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것)  
⑦ 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

#### 7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것
- 4) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
- 5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류, 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(프레로메타이드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것

#### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

#### ● 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

● 제조자: 경진제약사 경기도 이천시 읍면 일대로406번길 6

#### ● 포장단위: 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제조의뢰자: 경남제약주주 충남 아산시 신항면 서부남로790번길 49

#### ※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
  2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하지 않습니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.  
소비자 상담전화: 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자보전 해결기준"에 의해 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 <http://drug.mfds.go.kr> → "의약품 검색", 을 참조하시기 바랍니다.



경남제약주  
Kyung Nam Pharm., Co., Ltd.