

활성비타민, 항산화제, UDCA를 함유한
고함량 기능성 비타민

벤포메가 정



【원료약품 및 그 분량】 1정(1,200 mg) 중

시아노코발라민 0.1%(시아노코발라민으로서 100.0 μ g)(KPC)	100.00 mg
리보플라빈(KP)	100.00 mg
폴산(KP)	100.00 μ g
아스코르브산(KP)	100.00 mg
산화아연(아연으로서 15.0 mg)(KP)	18.68 mg
파리독신염산염(KP)	100.00 mg
니코틴산아미드(KP)	100.00 mg
판토텐산칼슘(KP)	100.00 mg
벤포티아민(티아민염산염으로서 36.15 mg)(KPC)	50.00 mg
d-비오틴(USP)	100.00 μ g
콜린타르타르산염(DAB)	100.00 mg
이노시톨(KP)	100.00 mg
우르소데옥시콜산(KP)	5.00 mg
토코페롤아세테이트 50%(비타민 E로서 10.0 IU)(KPC)	20.00 mg
γ -오리자놀(KPC)	10.00 mg
콜레칼시페롤과립(비타민 D로서 500 IU)(KPC)	5.00 mg

【성 상】 적색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기·눈의 피로·빠, 이의 발육불량·구루병의 예방

2. 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회 1정을 식후 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
- ※ 기타 자세한 사항은 첨부문서 및 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【소비자상담실】 1688-4425

【사용기한】 외부포장에 표기 【포장단위】 60정, 120정

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

• 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

• 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

첨부문서 작성일 : 2012년 11월

【제조원】 한풍제약

전북 전주시 덕진구 구렛들3길 11

【판매원】 일양약품(주)

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110