

일반의약품
분류번호 132

이제 코로 숨쉬세요

노즈케어

점비액 분무식

• 급성비염, 알레르기성 비염 • 코막힘, 콧물, 재채기 • 머리 무거움

【원료약품 및 그 분량】 이 약 100mL 중

유효성분 : 나파졸린염산염(USP)	50mg
클로르페니라민말레산염(USP)	250mg
글리시리진산디칼륨(KP)	300mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	90mg
파라옥시벤조산프로필	10mg

기타 첨가제 : 엘-멘틀, 정제수, 폴리소르베이트80, 프로필렌글리콜

【성상】 일정량씩 분무되는 용기에 든 특이한 방향성이 있는 무색 투명한 액제


【효능·효과】 급성비염(코염), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법·용량】 성인 및 7세 이상의 소아 : 1회 1~2번씩 비강(코안)내에 분무한다(뿌린다).
3시간 이상의 투여간격을 두며 1일 6회를 넘지 않도록 한다.

「노즈케어점비액 사용방법」

(안전핀 제거 후 사용하세요.)

1. 사용전 용기를 잘 흔든 후 공기중으로 2~3회 분사시켜 균일한 분무량이 나오도록 합니다.
2. 먼저 코를 잘 푼 다음 용기의 노즐부분을 콧구멍에 넣고 용법·용량에 나와있는 횟수만큼 분무하십시오.
같은 방법으로 반대편 콧구멍에도 투여합니다.
3. 사용 후 뚜껑을 닫고 항상 세워진 상태로 보관하십시오.



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 미만의 유아
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약(비염(코염) 분무제 포함)에 의해 알레르기증상(예 : 발열, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
 - 2) 3일간 사용하더라도 증상이 좋아지지 않을 경우
4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
 - 3) 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
 - 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
 - 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
 - 6) 사용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작에 주의할 것.
 - 7) 사용 시에는 음주하지 말 것.
 - 8) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 18mL

【교환 및 방법】

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 구입처를 통하여 교환해드립니다.
- 소비자 상담실 : 080-933-2233

첨부문서 최종 개정 년월일 : 2018. 2. 12

온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품정보를 참조하세요.

제조의회사
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 능안로 47
제조사
Firson (주) 퍼슨
충남 천안시 서북구 백석공단 1로 47