

간질환 보조 치료제

일반의약품

조제용

헤파가드^{연질캡슐} 350mg

(밀크시슬열매건조엑스)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규) 350.0mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호(퀴놀린옐로우WS)
- 첨가제(동물유래성분) : 숙신산젤라틴(소, 가축)
- 기타첨가제 : 경화유, 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 중쇄트리글리세리드, 카르나우바납, 콩기름

【성상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

5. 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP*6) 【사용기한】 외부포장참조 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 (주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【제조회사】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2026.06.20) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2026년 06월 20일



(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.