

고단위 비타민D의 보급제

와이디1000

연질
캡슐**[원료약품 및 분량]** 1캡슐 (190mg)중

농축콜레칼시페롤(유상형)(BP).....1.00mg

(비타민D로서 1000IU)

토코페롤아세테이트(KP).....10.00mg

(비타민E로서 10IU)

첨가제 : 락색소(천연색소)

[성 상] 미황색(연노랑)의 투명한 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐**[효능 · 효과]**

1. 다음 경우의 비타민 D, E 의 보급
 - 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용**[사용상 주의사항]**

- 1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장 질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - (4) 신장결석 환자
- 2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ①비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다,
 - (3) 신장결석 병력이 있는 환자
- 3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적

- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[포장단위] 60연질캡슐 * 2 = 120연질캡슐

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실(반품 및 교환처)] 02-430-5665

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2013년 02월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성연월 : 2013년 02월

제조원

RP Corp (주) 알피 Corp

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

판매원

YD 와이드메디텍주식회사
YDMEDITECH CO., LTD.

서울 송파구 거마로2길 15 양지빌딩 202호