

월 1회 1정 복용 골다공증 치료제

프로이반®정150mg

이반드론산나트륨일수화물
(이반드론산 150mg)

- 원료약품의 분량 : 1정 중
이반드론산나트륨일수화물(별규)..... 168.75mg
(이반드론산으로서 150mg)
• 첨가제(동물유래) : 유당수화물

- 성상 :
흰색 내지 거의 흰색의 장방형 필름코팅정

- 효능·효과 :
폐경 후 여성의 골다공증 치료

■ 용법·용량

- 월 1회 1정을 정기적으로 매일 같은 날 아침에 음식물, 음료수(물 제외) 또는 다른 경구 약물이나 식품 보조제(칼슘 포함) 등을 섭취하기 최소 1시간 전에 충분한 양의 물과 함께 복용합니다 :
 - 이 약은 서 있거나 똑바로 앉아있는 자세에서 충분한 양(180~240mL)의 물로 삼켜야 하며, 복용 후 60분 간 누워서는 안됩니다.
 - 광천수는 이 약의 흡수를 저하시킬 수 있으므로, 일반 물과 복용해야 합니다.
 - 식도궤양을 피하기 위해, 씹거나 빨면 안됩니다.
- 환자가 정기 복용일에 복용하는 것을 잊었을 경우
 - 다음 정기 복용일까지 8일 이상 남아있으면, 복용일을 놓쳤다고 인식한 다음날 아침에 1정을 복용하고 이 후부터는 기존에 예정되어 있던 정기 복용일에 매 달 1정씩 복용합니다.
 - 다음 정기 복용일까지 7일 이내로 남아있으면, 다음 정기 복용일에 1정을 복용하고 이 후에도 기존에 예정되어 있던 정기 복용일에 매 달 1정씩 복용합니다.
 - 같은 주 내에 2정을 복용해서는 안 됩니다.
- 식이섭취가 적절하지 않은 환자는 칼슘 또는 비타민 D 등을 보충 하여야 합니다.
- 간장에 환자
 - 용량조절이 필요치 않습니다.
- 신장에 환자
 - 크레아티닌 클리어런스가 30mL/min 이상인 경미하거나 중등도의 신장에 환자는 용량조절이 필요치 않으며, 30mL/min 미만인 환자에 대해서는 임상검칙이 충분치 않으므로 이 약의 투여가 권장되지 않습니다.
- 노인
 - 용량조절이 필요치 않습니다.
- 소아 및 청소년
 - 18세 이하 소아에서의 유효성 및 안전성은 연구되지 않았습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 이 약의 다른 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 치료되지 않은 저칼슘혈증 환자
- 3) 적어도 60분 동안 똑바로 앉거나 서 있을 수 없는 환자
- 4) 협착 또는 이완불능증과 같이 식도 배출을 지연시키는 식도기능이상 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

중증 신부전 환자(크레아티닌 클리어런스 30mL/min 미만)

3. 이상반응

- 1) 47개의 위약-대조 임상시험에서 1,251명의 환자를 대상으로 1일 1회 투여하는 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg의 안전성이 평가되었습니다 : 이 환자들의 73%는 3년간의 치료 임상시험에 속합니다. 모든 시험에서 1일 1회 투여한 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg의 전체 안전성 프로파일은 위약과 유사하였습니다. 치료임상시험에서 이상반응, 즉 시험 약물과 관련 가능한 또는 관련 있을 것으로 생각되는 이상반응을 경험한 환자의 전체 비율은 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg 및 위약군에서 각각 19.8% 및 17.9%였습니다.
- 2) 폐경 후 골다공증 환자를 대상으로 한 2년간의 임상 시험에서 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg을 월 1회 투여한 군과 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg을 1일 1회 투여한 군의 안전성 프로파일은 유사하였습니다. 이상반응, 즉 시험약과 관련 가능성이 있거나 관련 있을 것으로 추측되는 이상반응을 경험한 환자의 전체 비율은 1년 및 2년 후에 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg 투여군에서 22.7%, 25.0%, 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg 투여군에서 21.5%, 22.5%였습니다. 이상반응의 대부분은 경증~중등도였으며, 치료 중단을 유도하지 않았습다.
- 3) 골다공증 치료 임상시험에서 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg을 매일 투여한 군과 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg을 매일 투여한 군 및 항-골절 임상시험에서 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg을 매일 투여한 군에서 1% 이상 발생한 이상반응을 표 1, 2에 나열하였습니다. 표에는 두 연구에서 항-골절 임상시험의 위약 투여군과 비교하여 더 높은 빈도로 나타난 이상반응이 나와있습니다.

표 1 골다공증 치료 임상시험에서 1년 후와 항-골절 임상시험(3년간)에서 연구자에 의해 시험약과 관련 가능성이 있는 것으로 추측되는 일반적인 이상반응(> 1/100, ≤ 1/10)

	골다공증 치료 임상시험		항-골절 임상시험	
기관계/이상반응	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 150 월 1회	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 25 월 1회	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 25 월 1회	위약 (N=975)

	(N=335) (%)	(N=335) (%)	(N=977) (%)	(%)
위장관계				
소화불량	3.3	5.8	4.3	2.9
구역	3.3	3.5	1.8	2.3
복통	3.5	2.8	2.1	2.9
설사	2.5	1.8	1.4	1.0
고창	0.5	1.0	0.4	0.7
위식도 역류 질환	0.5	1.0	0.4	0.1
신경계				
두통	0.8	1.5	0.8	0.6
전신이상				
인플루엔자 유사 질환*	3.3	0.3	0.3	0.2
피로	1.0	0.3	0.3	0.4
근골격계				
근육통	1.5	0.3	1.8	0.8
관절통	1.0	0.3	0.4	0.4
피부이상				
발진	0.8	1.0	1.2	0.7

* 일시적인 인플루엔자 유사 증상은 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg을 월 1회 투여 시 일반적으로 초하 투여와 관련하여 보고되었습니다. 인플루엔자 유사 질환은 급성기 반응 또는 증상으로 관절통, 근육통, 열, 오한, 피로, 구역, 식욕상실, 뼈의 통증을 포함합니다. 이런 증상들은 일반적으로 단기간, 경증~중등도의 강도이며, 치료기간 동안 의학적 처치 없이 회복되었습니다.

표 2 골다공증 치료 임상시험에서 2년 후와 항-골절 임상시험(3년간)에서 연구자에 의해 시험약과 관련 가능성이 있는 것으로 추측되는 일반적인 이상반응(> 1/100, ≤ 1/10)

	골다공증 치료 임상시험		항-골절 임상시험	
기관계/이상반응	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 150 월 1회 (N=335) (%)	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 25 월 1회 (N=335) (%)	이반드론산 나트륨 단일 제(경구) 25 월 1회 (N=977) (%)	위약 (N=975) (%)
위장관계				
소화불량	4.0	6.3	4.0	2.7
구역	3.0	3.5	1.8	2.3
복통	4.0	3.0	2.1	2.9
설사	2.5	2.0	1.4	1.0
위염	1.0	0.3	0.7	0.5
위식도 역류 질환	0.8	1.0	0.5	0.1
식도염	0	1.0	0.5	0.4
신경계				
두통	0.8	1.5	0.8	0.6
전신이상				
인플루엔자 유사 질환*	3.3	0.3	0.3	0.2
근골격계				
근육통	1.5	0.3	1.8	0.8
관절통	1.0	0.5	0.4	0.4
관절염	0.5	1.0	0.1	0.4
근골격통	1.0	0.5	0	0
근골격 경직	1.0	0	0	0
피부이상				
발진	0.8	1.0	1.2	0.7

* 일시적인 인플루엔자 유사 증상은 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg을 월 1회 투여 시 일반적으로 초하 투여와 관련하여 보고되었습니다. 인플루엔자 유사 질환은 급성기 반응 또는 증상으로 관절통, 근육통, 열, 오한, 피로, 구역, 식욕상실, 뼈의 통증을 포함합니다. 이런 증상들은 일반적으로 단기간, 경증~중등도의 강도이며, 치료기간 동안 의학적 처치 없이 회복되었습니다.

- 4) 골다공증 치료 임상시험에서 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg을 매일 투여한 군과 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg을 매일 투여한 군에서 1% 이하의 빈도로 발생한 이상반응은 다음과 같습니다. 항-골절 임상시험에서 위약군 보다 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg 1일 1회 투여군에서 좀 더 빈번하게 발생한 이상반응과 골다공증 치료 임상시험에서 이반드론산나트륨 단일제(경구) 25mg 1일 1회 투여군 보다 이반드론산나트륨 단일제(경구) 150mg 월 1회 투여군에서 더 빈번하게 발생한 이상반응을 나열하였습니다.

때때로(1/100 ~ 1/1,000)

위-장관계 이상 : 심심관란, 구토, 위염, 식도 궤양 또는 협착을 포함한 식도염
신경계 이상 : 어지러움
근골격계 및 결합조직 이상 : 요통

드물게(1/1,000 ~ 1/10,000)

위-장관 이상 : 심이직장염
면역계 이상 : 과민반응
피부 및 피하조직 이상 : 혈관부종, 안면부종, 두드러기

- 5) 비스포스포네이트계 약물이 눈의 염증과 관련되어 있을 수 있다는 보고가 있습니다. 이반드론산나트륨 단일제(경구)를 월 1회 투여한 2명의 환자에서 포도막염과 공막염 같은 눈의 염증이 나타났습니다.

6) 국외 시판 후 조사

- (1) 이반드르네이트를 투여 받은 환자에서 매우 드물게 턱의 골괴사가 보고되었습니다.
- (2) 눈이상 : 이반드르네이트를 포함한 비스포스포네이트계 약물 투여 시 포도막염, 상공막염, 공막염 같은 안구 염증이 보고되었습니다. 일부에서 이런 증상은 비스포스포네이트계 약물 투여를 중단 시 소실되었습니다.
- (3) 면역 체계 이상
 - 이반드르네이트를 투여 받은 환자들에서 치명적인 경우를 포함한, 아나필락시스 반응/쇼크가 보고되었습니다.
 - 천식 악화를 포함해 알레르기 반응이 보고되었습니다.
 - 스티븐슨 증후군, 다형홍반, 그리고 수포성 피부염을 포함해 중증의 피부 유해 사례가 보고되었습니다.

- (4) 상처, 종독 및 처치와 관련된 합병증
- 이반드로네이트를 포함한 비스포스포네이트계 약물 투여 시 비정형 전자하 및 골간 대퇴골 골절(atypical subcutaneous and diaphyseal femoral fractures)이 보고되었습니다.
- 7) 국내 시판 후 조사
64명에서 6년 동안 폐경 후 골다공증인 여성 환자 647명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과 유해사례의 발현율은 인과관계와 관계없이 4.96%(32명/647명, 442)로 보고되었습니다.
- 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응은 4.79%(31명/647명, 42)로 소하불량 1.85%(12명/647명, 13), 인플루엔자 유사증후군 1.85%(12명/647명, 12), 근육통 1.39%(9명/647명, 9), 순으로 가장 많았고, 그밖에 0.31%(2명/647명, 2)이하로 보고된 약물유해반응은 눈의 이상감각, 구토, 위식도역류, 무력증, 피로, 두통, 소양증이었습니다.
이 중 중대한 약물유해반응은 없었고, 예상하지 못한 약물유해반응은 0.46%(3명/647명, 3)로 눈의 이상감각, 무력증, 소양증이 각각 1건씩 보고되었습니다.

4. 일반적 주의

- 이 약 투여하기 전 저칼슘혈증, 뼈와 무지질 대사 장애를 치료해야 합니다. 모든 환자에서 적절한 양의 칼슘과 비타민 D를 섭취하는 것이 중요합니다.
- 경구 비스포스포네이트계 약물은 상부 위장관 점막의 국소 자극을 유발할 수 있습니다. 이러한 자극이 발생하고 기저 질환이 악화될 가능성이 있으므로, 활동성 상부 위장관 장애 환자(Barratt의 식도, 삼킴 곤란, 기타 식도 질환, 위염, 십이지장염 또는 궤양 등)가 이 약을 복용할 경우 주의하여야 합니다.
- 경구 비스포스포네이트계 약물을 복용한 환자에서 식도염, 식도궤양, 식도 침식 등 유해사례가 보고되었으며, 일부는 중증으로 입원이 필요하였고 드물게 출혈이 발생하거나 식도 협착 또는 천공까지 이르는 사례가 있었습니다. 용법·용량에 따라 복용하지 않은 환자 및/또는 식도 자극 증상이 발생한 경우에도 비스포스포네이트계 약물 복용을 지속한 환자에서 중증의 식도 유해사례 발생 위험성이 높았습니다. 그러므로 용법·용량에 따라 정확히 투약하여야 합니다.
- 의사는 환자에게 치료 중 나타날 수 있는 식도반응의 증상 또는 징후를 알려주고 주의를 기울여야 하며, 삼킴 곤란, 삼킴 시 통증, 흉골 뒤 통증 및 가슴 쓰림이 생기거나 악화되었을 경우 이 약의 복용을 중단하고 치료를 받도록 지시해야 합니다.
- 비스테로이드성 소염진통제는 위장관 자극과 관련되기 때문에, 이 약과 병용하여 투여하는 동안 주의하여야 합니다.
- 비스포스포네이트를 투여한 환자에서 턱의 골괴사증이 보고된 바 있습니다. 보고된 대부분이 치과 치료 중인 압환자였으나 폐경 후 골다공증 또는 다른 질환 환자에서도 그러한 사례가 보고된 바 있습니다. 턱의 골괴사증의 위험인자로는 양전단, 병용요법(예: 화학요법, 방사선요법, 코르티코스테로이드), 동반된 질환(예: 빈혈, 응고장애, 감염, 기존의 치과 질환) 등이 있습니다. 대부분의 경우 비스포스포네이트를 정맥 투여한 환자에서 보고되었으나 일부 경우 투여한 환자에서도 보고되었습니다.
- 위험인자(악, 화학요법, 방사선요법, 코르티코스테로이드, 취약한 구강 위생상태)가 있는 환자에 비스포스포네이트를 투여하기 전에 적절한 예방적 치과 치료를 포함한 구강검사를 고려하여야 합니다.
- 약물투여 중에는 가능한 한 과도한 치과 치료를 피해야 합니다. 비스포스포네이트 투여 중 턱의 골괴사증이 발생한 환자에서 치과적 수술은 상태를 악화시킬 수 있습니다. 치과치료가 필요한 환자에서 비스포스포네이트 투여중단이 골괴사증의 위험을 감소시키는지에 대한 유용한 자료는 없습니다. 각 환자별로 치료 시 유익성 및 위험성을 평가하여 해당 전문의의 임상적 판단에 따라 환자 치료 계획을 수립합니다.
- 골다공증 예방 및 치료를 위하여 비스포스포네이트계 약물을 복용한 환자에서 중증의 골, 관절 및/또는 근육 통증이 보고되었습니다. 증상 발현 시기는 약물 투여 후 1일에서 수개월로 다양하였습니다. 대부분의 환자들은 약물 중단 후 증상이 완화되었습니다. 동일 약물 또는 다른 비스포스포네이트계 약물을 다시 복용할 경우 증상이 재발하였습니다.
- 비스포스포네이트 치료를 받은 환자에서 대퇴골간부(femoral shaft)에 비정형(atypical), 저강도(low-energy) 또는 저외상(low-trauma) 골절이 보고되었습니다. 이러한 골절은 대퇴골소전자(lesser trochanter)에서 과상부 상면(supracondylar flare) 바로 윗부분까지 대퇴골기 어느 부위에서든지 나타날 수 있으며, 분쇄에 대한 증거가 없는 상태에서 본질적으로 가로 또는 짧은 사선형태로 나타납니다. 비스포스포네이트 치료를 받지 않은 골다공증 환자에게서도 이러한 골절이 발생하기 때문에 인과관계는 확립되지 않았습니다.
비정형 대퇴골 골절은 외상에 최소한도로 있는거나 전혀 없었던 후에 가장 흔하게 나타났습니다. 이는 양쪽 모두 발생할 수 있으며, 대다수의 환자들이 완전 골절(complete fracture)이 발생하기 전 수 주에서 수 개월 동안 영향받은 부위에서 보통 둔하면서 아린 넓적다리 통증으로 대변되는 전구통증을 보고합니다. 소수의 보고에서 골절이 나타났을 때 골루코르티코이드제제(예: 프레드니손) 치료를 병행하였다고 언급하고 있습니다.
비스포스포네이트제제에 노출된 이력이 있는 넓적다리(thigh) 또는 서혜부(groin) 통증이 나타난 어떠한 환자든지 비정형 골절을 의심해야 하며, 불완전 대퇴골 골절(incomplete femur fracture)을 배제하기 위하여 평가해야 합니다. 비정형 골절이 나타난 환자는 반대쪽 팔다리에서 골절의 증상 및 징후가 있는지 여부 또한 평가해야 합니다. 환자 개별적으로 유익성/위해성 평가를 기다리는 동안 비스포스포네이트 치료의 중단을 고려해야 합니다.

5. 상호작용

- 유유, 음식물, 칼슘, 다량 양이온(예: 알루미늄, 마그네슘, 철)들을 포함한 제품들은 이 약의 흡수를 저해할 수 있습니다. 따라서 이 약 경구투여 후 적어도 1시간 동안은 음식물이나 이러한 제품들을 섭취하지 않아야 합니다.
- 칼슘보조제, 제산제, 다량 양이온(알루미늄, 마그네슘, 철)을 포함한 경구투여 약물은 이 약의 흡수를 저해할 수 있습니다. 따라서 이 약 경구투여 후 적어도 1시간 동안은 다른 약물을 섭취하지 않아야 합니다.

- 다발성 골수종 환자에게 멜팔란/프레드니손과 병용투여 시, 상호작용이 관찰되지 않았습니다.
- 폐경기 여성에 대한 약독학 연구에서 타목시펜 또는 호르몬 대체요법제(에스트로겐)와 상호작용이 없었습니다.
- 정맥투여된 라니티딘은 이 약의 생체이용율을 약 20%까지 증가시켰습니다. 그러나 이반드로넨산나트륨 단일제(경구)에 대한 생체이용율의 정상변동 범위 이내이므로, 위내 pH를 증가시키는 H₂ 길항제나 다른 약물과 병용투여 시 이 약의 용량조절은 필요치 않습니다.
- 이 약은 간에서 전환되지 않으며, 인간의 주요 간 시토크롬 P450 동종효소(cytochrome P450 isoenzyme)를 억제하지 않고, 쥐에서 간 시토크롬 P450 계를 유도하지 않으므로, 약물대사로 인한 약물상호작용은 우려되지 않습니다. 덧붙여 혈장단백질 결합은 약 85%~87%(생체)와 시혈을 통해 약물 치료농도에서 확인됩니다.)였었습니다. 또한 이 약은 신장 분비로만 배설되며 생체내 변환을 거치지 않습니다. 분비경로는 이미 알려져 있는 다른 약물 배설에 포함된 산 또는 염기 수송체를 포함하지 않습니다.
- 골다공증을 갖는 폐경 후 여성에 대한 연구에서(BM 16549), 아스피린 또는 NSAIDs 병용투여 시 상부 위장관 증상 발생은 이반드로넨산나트륨 단일제(경구) 2.5mg 1일 1회 투여군과 150mg 월 1회 투여군에서 유사하였습니다.
- 골다공증을 갖는 폐경 후 여성에 대한 연구에서(BM 16549), 환자의 14%가 H₂ 길항제 또는 proton pump 억제제를 필요로 했으며 이 환자 중 상부 위장관 반응 발생은 이반드로넨산나트륨 단일제(경구) 2.5mg 1일 1회 투여군과 150mg 월 1회 투여군에서 유사하였습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

이 약의 사용경험이 없으며 사람에 대한 잠재적인 위험성은 알려져 있지 않으므로 이 약을 사용하지 않습니다.

- 임산부 : 쥐에 대한 동물실험결과 생식독성이 관찰되었습니다.
- 수유부 : 쥐에 대한 동물실험결과 이 약을 정맥투여 시 소량이 모유 중으로 이행되었습니다. 이 약이 사람의 모유 중으로 이행되는 지는 알려져 있지 않습니다.

7. 고령자에 대한 투여

용량조절이 필요치 않습니다.

8. 소아에 대한 투여

18세 이하 소아에서의 유효성 및 안전성은 연구되지 않았습니다.

9. 임상 검사치에의 영향

3년간 이반드로넨산나트륨 단일제(경구) 2.5mg을 1일 1회 투여한 임상시험에서 간 또는 신부전, 혈액학적 손상, 저칼슘혈증 또는 저인산혈증 등을 나타내는 임상 검사치의 이상은 위약과 비교 시 차이가 없었습니다. 이와 유사하게, 1년 및 2년간 이반드로넨산나트륨 단일제(경구) 2.5mg 및 이반드로넨산나트륨 단일제(경구) 150mg 투여군 간에 어떤 차이도 관찰되지 않았습니다. 다만, 다른 비스포스포네이트계 약물에서와 마찬가지로 총알칼리당소파티제가 위약과 비교하여 감소하였습니다.

10. 과량투여시의 처리

이 약 과량투여 시의 처리에 대한 유용한 정보가 없습니다. 그러나 경구 과량투여 시 위부 불편, 소화불량, 식도염, 위염 또는 위궤양과 같은 상부 위장관 이상반응이나 저칼슘혈증, 저인산혈증이 발생할 수 있습니다. 이 경우에도 이 약과 결합시키기 위해 유유나 제산제를 복용하도록 하며, 식도 자극의 위험이 있으므로 구토를 유도해서는 안되고, 환자는 직립 상태를 유지하여야 합니다. 투석은 유익하지 않습니다.

11. 운전 및 기계조작에 대한 효과

운전 및 기계조작에 대한 이 약의 효과는 연구되지 않았습니다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.
- 사용하지 않거나 사용기간이 지난 의약품의 처리 : 의약품이 자연환경에 노출되는 것을 최소화해야 합니다. 의약품을 폐수를 통해 처리하거나 가정용 쓰레기로 분리하면 안됩니다. 가능한 의약품 수집전용 시스템을 통하여 처리해야 합니다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 1정

Ⓡ = 등록상표

* 본 제품은 GMP규정에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한의 경과, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설 및 약 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의처 : 고객센터전화(080-405-1238)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 복용 시 주의사항 : PTP 포장의 약제는, PTP 은박을 잘못 뜯게 되면 은박의 예리한 부분이 식도 점막을 손상시킬 수 있으므로, 약제 사용 시 반드시 PTP 은박을 잘 분리한 후 복용하십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2015년 9월 20일)이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 고객센터전화(080-405-1238)에서 확인 하실 수 있습니다.

문안최종개정일자 : 2015. 09. 20

TMSPBIP-5

제조의회사  **원인제약(주)**

경기도 안성시 공단로 50

제조사 신평제약(주)

경기도 안산시 단원구 원시로 7