

위궤양치료제

후레바정

(레바미피드)

Hureba Tab.

후레바정의 Rebamipide 성분은 위액으로 인한 손상을 회복시키는 프로스타글린딘 생성을 증가시켜 위점막 보호작용과 궤양치유 능력을 가져 위염, 위궤양 치료에 사용됩니다.

[약 리 작용] 위 점막 프로스타글린딘 생성 촉진 작용, 점액물질 분비 증가작용에 영향을 끼쳐 위점막을 보호하여 위염, 위궤양을 치료합니다.

[특 장 점]

1) 위궤양에 대한 뛰어난 효과

후레바정은 위 점막 보호 작용, 합병증 작용, 조직 수복 작용을 통해 위염 및 위궤양에 대해 우수한 치료 효과를 나타냅니다.

2) 합병증 예방

후레바정은 NSAIDs 유발 위장관 합병증 예방에도 우수한 치료 효과가 기대되는 항궤양제입니다.

3) 낮은 부작용

후레바정은 혈중이행도가 낮아 부작용에 뛰어난 제제로서 전신이상 반응 및 약물상호작용에 대해 안심해도 좋습니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

레바미피드(KPC).....100mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

[성 상] 백색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기

[용법·용량]

1. 위궤양
보통 성인에게는 1회 레바미피드로서 100밀리그램(1정)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여한다.
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선:
급성위염, 만성위염의 급성악화기
보통 성인에게는 1회 레바미피드로서 100밀리그램(1정)을 1일 3회 경구 투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증 병력 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

여기서 '드물게'는 0.1%미만을, '때때로'는 0.1~5%미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5%이상 또는 빈도불명을 의미함

1) 중대한 이상반응

- ① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- ② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 기타 이상반응

- ① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
- ② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있다.
- ③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
- ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획중, 보혈구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있다.
- ⑤ 기타 : 유선 부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨, 또는 드물게 BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.

4. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다.)

5. 고령자에 대한 투여

고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비교령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】자사포장 단위

【저장방법 및 사용기간】차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자 상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

역은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

HUTECS

한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 907-6

제조/외주: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 상신리 907-6

제 조 자: 스카이뉴팜(주) 경기도 시흥시 정왕동 1234-3

설명서 작성일 120601

무수의약품제조관리기준

KGMP 적격인증번호