

트라마롤 **서방정**

(아세트아미노펜/ 트라마롤염산염)

Tramadol **ER tab.**

(Acetaminophen/Tramadol HCl)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(925.0mg) 중

아세트아미노펜(KP).....650.0mg

트라마롤염산염(EP).....75.0mg

첨가제 : 식약청인정 타르소소(황색 4호)

【성 상】 연한 황색의 장방형 껍질코팅서방정

【효능·효과】 중등도-중증의 만성 통증

【용법·용량】

12세 이상의 소아 및 성인 :

용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절한다.

초회용량으로 1정 두어물 권장하며, 그 이후 두어 간격은 최소 12시간 이상으로 하되, 1일 4정을 초과하지 않도록 한다.

이 약을 필요 이상 장기간 투여하지 않도록 하며, 질병의 특성 및 심한 정도로 인해 장기간 투여가 필요한 경우, 정기적인 모니터링을 실시하여 이 약의 지속투여 여부를 확인하도록 한다.

이 약의 투여 시 구역, 구토, 가려움증, 변비, 어지러움, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 환자의 반응을 면밀히 관찰하고 적절히 조절한다.

소아

소아 및 청소년에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여를 권장하지 않는다.

노인

복합적인 심인 용량을 투여하도록 한다. 단, 75세 이상의 노인에게 트라마롤을 경구 투여시 트라마롤의 소신반감기가 17% 증가하였으므로 최소 12시간 이상 간격으로 이 약을 투여하도록 한다.

신부전환자

신부전환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여를 권장하지 않는다.

간부전환자

간부전환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여를 권장하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 트라마롤을 권장용량 범위 내에서 투여받은 환자에서 알작이 보고된 바 있으며, 권장용량 이상 투여 시 알작의 위험은 증가되는 것으로 나타났다.

트라마롤을 다음의 약물과 병용시 알작의 위험은 증가된다;

- 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI 항우울제 또는 식욕감퇴제)
- 삼환계 항우울제 (TCAs) 및 다른 삼환계 약물 (예, 시클로펜자프린, 프로메타진 등)
- 다른 마약류

트라마롤은 다음의 약물과 병용시 알작의 위험을 증가시킬 수 있다;

- MAO (Monoamine Oxidase) 억제제
- 신경이완제
- 발작 역치를 낮출 수 있는 약물

각각 환자, 발작 병력자 또는 알작에 대한 위험인자 (머리 상해, 대사장애, 알코올 또는 약물 금단 환자, 중추신경계 감염)가 있는 환자에서 경련 발생의 위험이 증가될 수 있다.

2) 트라마롤 투약 환자에서 드물게 치명적인 아나필락시양 반응이 보고된 바 있다.

3) 과량의 트라마롤을 마취제 또는 알코올과 병용시 호흡억제가 나타날 수 있다. 이 약 과량 투여 시 호흡억제에 대한 처치를 실시해야 한다. 날독손을 투여할 경우에 알작이 있을 수 있으므로 주의하도록 한다.

4) 중추신경계 억제제를 복용한 환자에게 이 약을 투여시 중추신경계 및 호흡억제의 위험이 증가될 수 있다.

5) 두개관내압이 증가된 환자나 머리상해 환자에서 이 약의 투여는 아편제제의 호흡억제 효과로 이산화탄소 저류와 2차적인 뇌허혈의 악명 증가로 인해 이러한 증상이 심각하게 나타날 수 있다.

6) 매일 시간 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

7) 트라마롤은 모르핀(morphine)의 정신적, 육체적 의존성을 유발할 수 있다.

8) 간투과성 : 이 약에는 아세트아미노펜 및 트라마롤이 함유되어 있다. 아세트아미노펜은 때로 간이식 및 사망을 초래하는 급성 간부전과 관련이 있으며, 대부분의 간손상은 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 4,000 밀리그램을 초과하였을 때와 관련이 있으므로 사용시 주의한다. 특히 간장애 환자는 반드시 의사와 상의한 후 복용하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약의 성분에 과민성이 있는 환자

2) 알코올, 수면제, 중추작용진통제, 아편제 또는 항정신성 약물 등 중추신경계 작용약물 중독 환자

3) 심한 호흡억제상태 환자(가벼운 호흡억제가 나타날 수 있다.)

4) 두부손상, 뇌의 병변이 있는 경우로 의식혼탁의 위험이 있는 환자

5) MAO억제제를 투여받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경력이 있는 환자

6) 소화성궤양, 심한 열역이상 환자

7) 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 심기능부전 환자

8) 아스피린 환자(비스테로이드성 소염진통제에 의한 천식발작 유발)또는 병력이 있는 환자

9) 약물로 조절되지 않는 간질 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 모르핀 복용 또는 반사투여 환자(동물실험에서 가벼운 모르핀 길항작용이 인정되었으므로 급한 증상을 일으킬 수 있다.)

2) 아편제제, 마취제, 최면제, 폐노치아질, 신경안정제, 진정제 등과 같은 중추신경계 억제제 복용 환자

3) 담도질환 환자(동물실험에서 대량투여하는 경우 오니콜라균을 수축했다.)

4) 간장애 환자(동물 실험에서 혈청GOT, GPT 관상치의 상승을 보이는 수가 있다.)

5) 신장애 환자

6) 술수 환자

7) 아편에 과민증 환자

8) 간질 환자 또는 발작 발생 가능성이 있는 환자

9) 유산태, 원인을 모르거나 이유로 인한 의식 변화상태 환자

10) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

4.1. 이상반응

1) 과민증 : 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 정신장애 : 두려움, 피로, 흥조, 때때로 흥조, 경직, 실신, 금단증상이 나타날 수 있다.

3) 순환기계 : 때때로 고혈압, 고혈압악화, 저혈압, 부정맥, 심계항진, 빈맥이 나타날 수 있다.

4) 중추신경계 및 말초신경계 : 현기, 두통, 진전, 때때로 운동실조, 경련, 긴장항진, 편두통, 편두통 악화, 불수의근의 수축, 지각이상, 혼비, 현기증이 나타날 수 있다.

5) 소화기계 : 복통, 변비, 설사, 소화불량, 방귀, 구내진조, 구역, 구토, 때때로 연하곤란, 헛변(melena), 허부증이 나타날 수 있다.

6) 정신과적 장애 : 식욕감퇴, 불안, 착란, 도취, 불면증, 신경과민, 졸음, 때때로 건망증, 이인증, 우울증, 약물남용 및 의존, 감정 불안정, 환각, 발가부진, 약용, 비정상적 사고가 나타날 수 있다.

7) 혈액계 : 때때로 빈혈이 나타날 수 있다.

8) 호흡기계 : 때때로 호흡곤란이 나타날 수 있다.

9) 비뇨기계 : 때때로 단백뇨, 뇨노장애, 혈뇨, 뇨저류가 나타날 수 있다.

10) 피부 : 소양증, 발진, 발진, 두드러기 증가

11) 기타 : 간기능 이상, 체중감소, 이명, 비정상적인 시야, 오한이 나타날 수 있다.

트라마롤/아세트아미노펜의 임상시험에서는 보고된 바 없으나, 이 복합제 보다 더 많은 환자들에게 사용경험이 있는 트라마롤염산염 및 아세트아미노펜의 임상시험과 시판 후 조사에서 관련이 있는 것으로 보고된 기타 이상반응은 다음과 같다.

1. 트라마롤염산염

현기증, 기립성 저혈압, 시력, 이명, 심근허혈, 폐부종, 호흡기증상 (호흡곤란, 기관지경련, 천명, 기관지경련 부종), 알러지 반응(아나필락시스와 두드러기, 스티븐스-존슨 증후군), 식욕변화, 운동력약, 호흡기 억제, 인지 기능 이상, 집중곤란, 우울증, 자살경향, 간염, 간 기능 부전과 위장관 출혈. 또한 감전, 활동, 인지 및 감각을 변화시킬 수 있는 다양한 정신 부작용이 개인에 따라 다르게 나타날 수 있다. 심혈관계에서 크레아티닌과 간기능 검사를 포함한 심혈관계 검사에서의 수치가 증가되었다는 보고가 있으며, 드물게 프로트롬빈 시간 상승을 포함하여 와파린 작용 변화가 밝혀졌다. 트라마롤을 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)와 MAOIs와 같은 세로토닌 재흡수 억제제와 병용시 세로토닌 증후군(정신상태 변화, 반사항진, 발열, 병립성 진전, 혼란, 발한, 발작, 혼수, 빈맥, 착란, 운동실조, 근경련, 설사 등이 포함)이 보고되었다. 인과관계는 확립되지 않았지만 천식의 악화가 보고된 바 있으며, 마약중단 중 나타나는 것과 유사하게 금단증상이 나타날 수 있다.

2. 아세트아미노펜

알레르기 반응 (주로 피부 발진) 또는 아세트아미노펜에 대한 2차성 과민반응이 드물게 보고되었다. 일반적으로 약물 투여 중단 후 회복되었고, 필요한 경우 증상 치료가 실시되었다. 혈소판 감소증과 부갑상선 기능 저하를 포함한 혈액장애가 보고된 바 있으나 반드시 아세트아미노펜과 관련된 것은 아니다. 아세트아미노펜이 와파린 유사물질과 같이 투여했을 때 지프로트롬빈혈증을 일으킬 수 있음을 나타내는 여러 보고가 있다. 다른 연구에서는 프로트롬빈 시간은 변하지 않았다.

4.2 트라마롤/아세트아미노펜 시판증의 이상반응

1) 만성 하루 요율 환자를 대상으로 투약위해성, 위약대조, 평평균 이중 눈가림 임상시험(n=245)에서 이상반응으로 인해 조기 투여를 중단한 환자는 위약군 6명(5.00%), 이 약 투여군 24명(19.20%)이었다. 이상반응은 총 169명의 피험자에서 발생하였고, 이 중 이 약 투여군 125명(83.20%)과 위약 투여군 120명(65.17%)에서 발생하였다. 중대한 이상반응은 총 4건(동맥 경화증, 심전도 비정상, 크레아티닌포스포키나제 증가, 유방암 등 1건)이 보고되었으나, 모두 시험약과 관련이 없는 것으로 판단되었다. 발생한 총 이상반응 중 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 73.6% (92명/125명, 236건)이었다.

또한 다른 트라마롤/아세트아미노펜 서방정의 활성대조(트라마롤/아세트아미노펜 일반정), 평평균 임상시험 (n=218)에서 이상반응은 총 104명에서 발생하였고, 이 중 이 약 투여군은 110명(48명(43.64%, 118건), 대조와 투여군은 108명 중 56명(51.85%, 107건)에서 발생하였다. 또한, 시험 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율을 분석한 결과, 이 약 투여군은 42.73% (47/110명, 112건)이고, 대조군은 48.15% (52/118명, 98건)이었다.

2) 요율 환자를 대상으로 국내에서 실시한 임상시험 중 2% 이상의 빈도로 보고된 이상반응은 다음과 같다: 가려움증, 구역, 구토, 두드러기, 두통, 변비, 소화불량, 식은땀, 식욕감소, 어지러움, 졸음, 갈증, 구강건조증, 다한증, 발진, 폐노장애, 부종, 불면증.

임상시험 중 이 약 투여군에서 보고된 이상반응을 발생기관별로 나열하면 다음과 같다. (매우 흔하게: 10% 이상, 흔하게: 1% 이상 10% 미만, 때때로: 0.1% 이상 1% 미만)

- ①감염 및 기생충 감염 : 때때로 - 폐렴, 폐렴, 비염, 코인두염
- ②근골격 및 결합조직 장애 : 흔하게 - 사지부종, 때때로 - 관절통, 근경련, 근육쇠약, 근육통
- ③눈의 장애 : 때때로 - 시야흐림, 결막염
- ④면역계 장애 : 때때로 - 면역반응감소
- ⑤신경계 장애 : 매우 흔하게 - 어지러움, 졸음, 흔하게 - 두통, 불면증, 때때로 - 감각이상, 통풍상 태, 미각이상, 분수의 경수축, 진전, 편두통
- ⑥심장 및 순환계 장애 : 흔하게 - 폐노장애, 혈뇨, 때때로 - 심근노, 무뇨증, 뇨노지체, 요관결, 뇨노
- ⑦위장관 장애 : 매우 흔하게 - 구역, 변비, 구토, 소화불량, 흔하게 - 구강건조증, 부부부증, 부부부 변장, 상부부부, 상부부부, 때때로 - 상부부부, 소화장애, 설사, 트림
- ⑧일반 장애 및 투여부위 상태 : 흔하게 - 갈증, 가슴불편, 얼굴발진, 오한, 발열, 때때로 - 말초 부종, 두드러기
- ⑨피부 및 피부조직 장애 : 매우 흔하게 - 가려움증, 흔하게 - 다한증, 두드러기, 발진, 식은땀
- ⑩혈관 장애 : 때때로 - 창백, 혈압변동
- ⑪호흡계, 흉곽 및 종격장애 : 흔하게 - 호흡곤란, 때때로 - 기침, 콧물
- ⑫기타 : 흔하게 - 뇌혈관이상, 때때로 - 혈압상승, 두근거림, 원경불규칙, 유방암, 상태

4.3 트라마롤/아세트아미노펜 일반정의 시판 후 이상반응

1) 국내에서 지시사항을 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 트라마롤/아세트아미노펜 일반정의 시판 후 조사결과 이상반응의 발현증례들은 약물과의 인과관계와 상관없이 4.57% (1,737명/37,967명, 2,501건)로 보고되었다. 이상반응은 구역, 변비, 구토 등의 소화기계 이상 반응이 총 1,391건(3.66%)으로 가장 많았고, 현기증, 두통 등의 신경계 유해사례가 563건 (1.48%), 전신이상반응이 149건(0.39%), 정신장애 이상 149건(0.39%), 피부 및 부속기관이 106건 (0.28%), 혈액계 31건(0.08%), 신장 및 비뇨기계 28건(0.07%), 순환기계 28건(0.07%), 호흡기계 21건(0.05%), 심혈관계 1건 및 기타 43건(0.11%)로 조사되었다.

트라마롤/아세트아미노펜 일반정의 인과관계를 배제할 수 없는 약물이상반응 발현율은

4.14%(1573명/37,967명, 2244건)이었다. 주된 약물이상반응으로는 구역 1.49%(567명/37,967명), 현기증 0.95%(358명/37,967명)이며, 그 밖에 1% 미만으로 보고된 이상반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.

- (1)전신이상: 두통, 피로, 발열, 부종, 흉통, 경직, 설신,
- (2)심혈관계: 순환성 심부전
- (3)신경계: 현기증, 두통, 현훈, 혼미, 권두통, 전진, 지각이상, 긴장향전, 권두통약화, 불수의근의 수축, 경련

- (4)호흡기계: 호흡곤란, 천식, 운동성호흡곤란, 기침, 기관지염
- (5)신장 및 비뇨기계: 배뇨장애, 뇨지류, 빈뇨, 신장기능 수치이상, 위뇨
- (6)피부 및 부속기관: 소양증, 발진, 발한증가, 두드러기
- (7)소화기계: 구역, 구토, 소화불량, 복통, 변비, 구강건조, 설사, 연하곤란, 방귀, 허부종, 타액증가, 직접암전염, 식도암전염, 위암전염, 마비성 장폐색증, 팽창증, 담낭염
- (8)정신계: 졸음, 불면증, 식욕감퇴, 불안, 우울증, 신경과민, 감정 불안정, 혼란, 이인증
- (9)혈액계: 변형, 헤모글로빈감소, 적혈구감소, 백혈구감소, 백혈구증가, 혈소판감소
- (10)순환기계: 심계항진, 고혈압, 부정맥, 빈맥, 고혈압약화, 대동맥협착
- (11)기타: 하혈, 황색대설상증, 체중감소, 이명, 오한, 열당이동증, 대뇌부종, 알레르기성비염, 비출혈, 비정상시각, 담도암 전염, 눈의 이물감, 간암전염, 장기기능 이상

중대한 약물이상반응은 간기능 이상, 담낭염, 마비성 장폐색증, 혼미 등이 각 1례씩 보고되었으며, 예상치 못한 약물이상반응으로 담낭염, 팽창증, 마비성 장폐색증, 신장기능수치이상(BUN/CR상), 타액증가, 하혈이 각 1례씩 보고되었다.

복수한 환자인 신장에 환자별 내성으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.25%(11명/176명, 165건) 이었으며, 주된 약물 이상반응은 구역 및 현기증이 각 4건(2.27%)씩 이었다. 중대한 약물이상반응은 예상하지 못한 이상반응은 없었다. 복수한 환자인 간장에 환자별 내성으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.03%(22명/362명, 36건)이었고, 주된 약물이상반응은 구역 12건(3.61%), 현기증 6건(1.81%) 이었다. 중대한 약물이상반응은 마비성 장폐색증, 담낭염, 간기능 이상 각 1건(0.30%)씩 이었고, 예상하지 못한 이상반응은 마비성 장폐색증과 담낭염 각 1건씩이었다.

2)국내 시판 후 조사기간 동안 자발적으로 보고된 중대한 이상반응은 구역 3건, 현훈, 호흡곤란 각 2건, 혼미, 권두통, 언어장애, 외식소실, 심근경색증의 제발, 지혈안, 구토, 소화불량, 착탄, 다발성 장기부전, 아나필락시스, 외도적인 과량 복용이 각 1건씩 총 23건으로, 이는 불확실한 규모의 인구집단으로부터 보고되었으므로, 그 정도 및 이 약의 인과관계를 확실히 추정하기가 어렵다.

3)또한 국내 시판 후 조사기간 동안, 총 5,566명을 대상으로 사용성적 조사 이외 별도로 실시한 시판 후 임상시험 결과, 예상치 못한 약물이상반응은 트림 2건(0.04%), 가슴불편감 1건(0.02%)씩 총 3건이 보고 되었다.

4)트라마돌/아세트아미노펜 일반제를 부여하기 전 치료약제(진통제) 부여력이 있는 환자군은 부여력이 없는 군에 비해 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다(5.92% vs 3.75%, p<0.001). 또한, 1일 평균부여량이 4정 이상인 조사대상자에서 이상반응 발현율은 8.35%(289/3460명)로 2정 이상 4정 미만 부여한 한 환자군 4.36%(1325/30419명)보다 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.(p<0.001)

5. 일반적 주의

1)진통효과를 추가하여 부여하지 않도록 하며, 다른 트라마돌 또는 아세트아미노펜 제제와 병용 부여하지 않도록 한다.

2)트라마돌은 의존성 발현이 낮은 약물이기는 하나, 장기간 부여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 부여기간을 조정하도록 한다. 약물남용 가능성이나 의존성의 위험이 있는 환자들은 신중히 관찰하며 단기간 부여하도록 한다. 트라마돌은 어떤 의존성 환자들과의 대제 약물로 적절하지 않으며, 아편작용 약물이나 모르핀의 금단증상을 억제하지 못한다. 아편 작용제-진통제 (남부전, 부프레노론, 펜타조신)와 병용시 수용체에서의 경쟁적 차단효과로 인하여 진통효과 감소와 금단증상 발생 위험이 있으므로 병용사용은 권장되지 않는다.

3)이 약의 부여할 갑자기 중단할 경우 불안, 발한, 발진, 갈증, 구토, 진전, 설사, 상기도 증후군, 협소, 혼돈, 신경과민, 운동과다증, 위장관 증상 등과 같은 금단증상이 나타날 수 있다. 중환 발작, 심한 불안, 과각, 지각이상, 이명, 비정상적인 중추신경계 반응 또한 매우 드물게 보고되었다. 임상경험상 약물량을 감량해 가며 중단할 경우 금단증상이 완화될 수 있다.

4)트라마돌은 부여 환자에서 중대한 아나필락시스와 반응을 포함하여 두드러기, 발진, 기관지 경련, 중독성 피부괴사 및 스티븐스-존슨 증후군 등의 알러지 반응이 보고된 바 있다. 로데인과 다른 아편제에 아나필락시스와 반응 병력이 있는 환자에서 그 위험이 증가될 수 있다.

5)알코올, 아편류, 마취제, 최면약, 폐노치아진, 신경안정제 또는 진정 수면제, 진정 항우울제, 진정 항히스타민제, 신경이완제, 중추작용 항고혈압제, 탈리도마이드, 바르비톨 등과 같은 중추신경계 억제제 투약 환자에게 이 약 부여시 주의하도록 하며, 이 약의 감량을 고려한다. 이러한 환자들에게 트라마돌 부여시 중추신경계 및 호흡 억제 위험이 증가될 수 있다. 이 약을 호흡 억제 위험이 있는 환자에게 부여시 주의하도록 하며, 다른 비아편제 진통제 사용을 고려하도록 한다.

6)일차 가능성이 있거나 발작 억제력 낮추는 기타 약물, 특히 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 삼환계 항우울제, 항정신병약, 중추작용 진통제 또는 국소마취제를 부여한 환자에게 트라마돌 부여시 경련이 보고된 바 있다. 약물로 조절된 간질환자나 간질 가능성이 있는 환자는 꼭 필요한 상황에서만 이 약을 부여해야 한다.

7)만성 알코올 중독자에게 과다한 아세트아미노펜 부여로 간독성이 증가될 수 있다. 간장에 환자에게 이 약의 부여를 권장하지 않는다.

8)간기능 부전 환자들에 대한 이 약의 약동학 및 내약성에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌과 아세트아미노펜은 주로 간에서 대사된다. 트라마돌염산염/아세트아미노펜 일반제는 중증도의 간부전 환자에게는 부여 간격을 연장하여 부여하는 것을 신중히 고려하고 중증의 간장애 환자에게는 부여를 권장하지 않는다.

9)신부전 환자들에 대한 트라마돌과 아세트아미노펜의 복합제에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌의 사용 경험으로 신기능 부전 환자에서 트라마돌과 활성 대사체 M1의 배설 정도와 배설률이 감소될 수 있다. 트라마돌염산염/아세트아미노펜 일반제의 경우 크레아티닌 청소율이 30mL/min 미만인 환자의 경우 이 약의 투약간격을 12시간 마다 2정을 추가하여 부여하지 않도록 한다.

10)트라마돌을 장기부여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 부여기간을 조정하거나 일시적으로 휴약기간을 가진다.

11)이 약과 와파린 유사약물을 병용할 경우에는 혈액응고시간 (INR) 증가 보고가 있으므로, 의학적으로 적절한 경우 프로트롬빈 시간을 정기적으로 평가하도록 한다.

12)한 연구에서 연부부종과 산화질소로 인한 마취증 트라마돌을 사용하였을 때 수술중 마취가 억제되는 경우가 증가되는 것으로 보고되었다. 추가 정보가 있을때까지 약한 수준의 마취 중 트라마돌의 사용을 피해야 한다.

6. 약물상호작용

1)선택적세로토닌재흡수억제제(SSRI 항우울제 및 식욕감퇴제), 삼환계 항우울제 (TCAs), 다른 삼환계 약물 (예, 프로미타진 등) 및 다른 아편제제 부여 환자에게 이 약 부여시 발작의 위험이 증가될 수 있다. 트라마돌은 발작의 역치를 낮추는 MAO 억제제, 신경이완제 또는 다른 약물을 병용하는 환자들에게서 발작의 위험을 증가시킬 수 있다. MAO 억제제를 부여하고 있는 환자에게 이 약 부여시 신중하도록 한다. 동물시험에서 MAO 억제제와 트라마돌을 병용시 시험동물의 사망 수가 증가되었다. 트라마돌과 MAO 억제제 또는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 병용시 발작 및 세로토닌 증후군 등 부작용이 증가될 수 있다.

2)카르바마제핀과 병용시 트라마돌의 혈장 농도 감소로 인하여 트라마돌 진통 효과 및 작용 시간이 유의하게 감소할 수 있다. 카르바마제핀이 트라마돌 대사를 증가시키고, 트라마돌의 발작 발생 위험을 증가시킬 수 있으므로 병용을 금한다.

3)트라마돌은 CYP2D6에 의해 대사체 M1으로 대사된다. 퀴니딘은 CYP2D6의 선택적 억제제이므로 트라마돌과 퀴니딘의 병용투여는 트라마돌의 농도를 증가시키고 M1의 농도를 감소시킨다. 이러한 현상의 임상적 중요성은 아직 미분다. 인체 간 마이크로좀 생체의 약물상호작용 시험에서 트라마돌은 퀴니딘 대사에 영향을 나타내지 않았으며, 클루옥세틴, 파록세틴, 아미트리프틸린과 같은 CYP2D6 저해제와의 병용투여는 트라마돌의 대사를 일부 저해하였다.

4)케토코나졸과 에리스로마이신과 같이 CYP3A4를 저해하는 것으로 알려진 기타 약물들은 트라마돌의 대사 (N-니메틸화)를 저해할 수 있고, 활성 O-니메틸화 대사체의 대사 또한 저해할 수 있다. 이러한 상호작용의 임상적 의미에 대해서는 연구된 바 없다.

5)아세트아미노펜의 흡수 속도는 메토프로프라마이드 또는 톨레리돈으로 증가될 수 있으며 톨레리돈으로 흡수가 감소될 수 있다.

7. 소아 및 노인에 대한 부여

1)소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

2)간, 신장, 심장 기능의 저하 및 동시에 수반되는 질환과 다양한 약물치료가 더 자주 일어날 수 있으므로 노인환자에서 이 약의 부여를 주의하여야 한다.

8. 일부 및 수유부에 대한 부여

1)일부에 대한 적절한 임상시험은 실시된 바 없으며, 태아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유효성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 부여한다.

2)트라마돌과 그 대사체는 유즙으로 소량 분비되므로, 수유부에는 부여하지 않는 것이 바람직하다.

9. 운전, 기계조작에 대한 영향
트라마돌은 졸음이나 현기를 일으킬 수 있으며 이것은 알코올 또는 기타 중추신경계 억제제에 의해 증강될 수 있다. 만취상태에 영향을 주기 때문에 운전이나 기계조작과 같은 위험 가능성이 있는 행위시 주의하도록 한다.

10. 과량 부여시의 처치

과량 부여시 트라마돌 독성, 아세트아미노펜 독성 또는 두 약물 모두의 독성 증상 및 징후가 나타날 수 있다.

1)트라마돌 과량 부여시 호흡억제, 기면, 혼수 발작, 심정지, 사망의 심각한 증상이 나타날 수 있다.

2)아세트아미노펜 과량 부여시 간부전 및 사망을 야기하는 간장의 소염증성적 과사가 나타날 수 있으며 신장의 세포괴사, 저혈당, 응고장애가 일어날 수 있다. 아세트아미노펜 과량 부여시 초기 증상은 구역, 구토, 피로, 쇠약 등이 나타나며 간독성의 임상과 실험실적 증가는 48-72시간 후에 나타나지 않을 수 있다.

3)과량부여시 응급조치가 가능한 기관이나 병원으로 연락하도록 하며, 일반적인 처치법과 함께 적절한 효능이 유지될 수 있도록 한다. 날록손 부여로 트라마돌 과량 부여로 유발된 증상을 일부 회복시킬 수 있으나, 발작의 위험이 증가된다. 트라마돌 사용 경험상 혈액부속은 4시간 무시하였으나, 마우스 임파로 7%가 제거되었으므로 과량부여시 처치법으로 유익하지 않다. 아세트아미노펜의 과량 부여시에는 10-12시간 이내에 N-아세틸시스테인을 정맥주사하거나 메치오닌을 경구부여하여 간을 보호한다.

11. 기타

1)트라마돌의 경우 동물시험에서 내성이 나타나므로 연을 및 증양의 경우에는 주의하여 부여한다.

2)이 약의 발암성, 변이원성 및 수태능 등에 유발을 평가하기 위한 동물시험 및 실험실적 시험이 실시되지 않았다.

3)발암성 : 트라마돌 30mg/kg (90mg/m², 1일 최대 임상용량 185mg/m²의 0.5배)을 2년간 마우스에게 경구 투여한 발암성 시험에서 폐와 간에서 종양 발생이 적었지만, 통계학적으로 유의하게 증가되었다. 인체와의 이러한 종양 발생 위험은 없으리라 사료되며, 트라마돌을 30mg/kg (180mg/m², 1일 최대 임상용량 1배) 부여한 랫드의 발암성 시험에서는 관찰되지 않았다.

4)유전독성 : 트라마돌은 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험, CHO 세포를 이용한 HPRT 유전자돌연변이시험, 마우스 림포마 tk⁺-유전자돌연변이시험을 제외한, 마우스와 햄스터를 이용한 소핵시험, 마우스를 이용한 우성치사시험에서 음성이었지만, 마우스 림포마 유전자 돌연변이시험 중 대사활성화와 메트 소핵시험에서 약한 변이가 유발되었다. 전체적인 시험결과를 볼 때, 트라마돌은 인체에서 유전독성 발생위험은 없다.

5)수태능 : 트라마돌을 수컷 랫드에게 50mg/kg (350mg/m², 1일 최대 임상용량 185mg/m²의 1.6배)까지 부여한 경우와 암컷 랫드에게 75mg/kg (450mg/m², 1일 최대 임상용량 185mg/m²의 2.4배)를 부여한 시험에서 수태능에 대한 영향은 관찰되지 않았다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

[포장단위] 100정

제조원 : 대원제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24

제조의뢰 및 판매원 : 제일약품(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 장강가창로 7

*약국 등와 개설자에 한하여 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 의약품 또는 부작용 등은 본사 마케팅부(수신자 부담 : 080-555-7171)에서 상담 및 교환, 교환에 드립니다. 그리고 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 책임공정 품질경영본부(전화 : 080-333-6312)로 연락바랍니다.

설명서작성년월일 : 2013. 01. 07
IX-B-0000-N1-01

*설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

제일약품