

에르버트정

【원료약품 및 분량】 이 약 1정 중

신나리진(KP).....	20mg
디멘히드리네이트(KP).....	40mg

【성상】 흰색의 원형 나정

【효능 및 효과】

메니에르 질환, 척추기저 부전에 의한 어지러움을 포함한 중추성/말초성 원인의 어지러움증 치료

【용법 및 용량】

1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 1일 3회, 1회 1정을 식후에 복용한다.
2. 치료 초기 또는 중증의 경우에는 하루 최대 5정까지 증량할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 성분 또는 디펜히드라민, 유사 구조를 지닌 다른 항히스타민제에 과민성의 기왕력이 있는 환자
 - 2) 임부 및 수유부
 - 3) 협우각 녹내장 환자
 - 4) 경련 환자
 - 5) 뇌내압이 증가한 환자
 - 6) 요도전립선 장애에 의한 뇨 저류 환자
 - 7) 알코올 남용 환자
 - 8) 갑축을 가하는 뇌내 돌기가 의심되는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 저혈압 환자
 - 2) 전립선 비대, 갑상선기능항진, 고혈압, 중증 관상동맥질환, 안압 상승, 유문심이지장 폐색 환자와 같이 항콜린성 치료에 의해 증상이 악화될 우려가 있는 환자
 - 3) 파킨슨씨병 환자
 - 4) 신부전 환자
 - 5) 간부전 환자
3. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 졸음, 드물게 두통, 발한, 추체외로 증상
 - 2) 순환기계 : 드물게 빈맥
 - 3) 소화기계 : 구갈, 드물게 소화불량, 변비, 체중증가
 - 4) 혈액계 : 아주 드물게 백혈구감소증, 가역성 무과립구증, دم즙분비정체성 황달
 - 5) 호흡기계 : 드물게 가슴 조임
 - 6) 눈 : 드물게 시야장애, 협우각 녹내장, 광과민성
 - 7) 기타 : 아주 드물게 과민성 반응, 루푸스양 피부 반응, 편평태선
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약은 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약 복용 중에는 운전 또는 기계조작을 삼갈 것.
 - 2) 이 약에 의한 위장장애를 감소시키기 위해서는 식사 후 복용한다.

5. 상호작용
 - 1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 이 약은 알코올, 바르비탈산 제제, 마약성 진통제, 신경안정제를 포함한 중추신경 억제제의 진정효과를 증강시킬 수 있다.
 - 2) Monoamine oxidase 저해제는 이 약의 항콜린 및 진정 효과를 강화시킬 수 있다.
 - 3) 이 약은 에페드린, 아트로핀과 같은 항콜린성 약물, 삼현계 항우울제의 효과를 증강시킬 수 있다.
 - 4) 이 약은 아미노글리코시드계 항생제의 이독성 증상 및 알레르기 피부시험에 대한 반응을 은폐시킬 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물시험에서 최기형성이 나타나지 않았으나 임부에 대한 안전성이 확립된 바 없으므로 임부에 투여해서는 안된다.
 - 2) 디멘히드리네이트는 소량이 유즙으로 배설되므로 수유부에게 투여해서는 안된다.
7. 소아에 대한 투여
 - 1) 12세 미만의 소아에 투여하는 것은 바람직하지 않다.
8. 과량투여시의 처치
 - 1) 과량투여의 예가 보고된 바는 없으나 구갈, 홍조, 동공 확대, 빈맥, 발열, 뇨저류와 같은 항콜린 효과와 더불어 졸음, 어지러움, 운동실조가 나타날 수 있다. 특히 상당히 많은 양을 복용할 경우 경련, 환각, 흥분, 호흡 억제, 고혈압, 진전, 혼수가 나타날 수 있다.
 - 2) 호흡장애 또는 순환부전에 대한 일반적 보조요법을 실시하며 등장 식염수로 위세척을 하는 것이 바람직하다. 특히 어린이의 경우 발열이 나타날 수 있으므로 체온을 면밀히 관찰한다.
 - 3) 경련양 증상은 단시간-작용 바르비탈산 제제에 의해 조절될 수 있으며 중추성 항콜린효과가 현저한 경우에는 physostigmine을 0.03mg/kg의 용량으로 서서히 정맥내, 필요에 따라서 근육내 주사한다 (성인: 최대 2mg, 소아: 최대 0.5mg).
 - 4) 디멘히드리네이트 성분은 투석이 가능하나 과량투여에 대한 처치로는 별 효과가 없으며 활성탄을 이용한 혈액관류로 상당량 제거할 수 있다. 신나리진의 투석 가능성에 대해서는 알려진 바 없다.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 02-2634-8002

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 설명서 최종 작성연월일 : 2012. 6. 26
- ※ 이 제품설명서 최종 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 <http://ezdrug.kda.go.kr>의 정보마당을 통해 확인하실 수 있습니다.

의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.