

일반 의약품
분류번호: 03130
KGMP적격업체

육체피로·체력저하엔 고향량 프리미엄 활성비타민

바이타액트

프리미엄정

기능성 활성 비타민



비타민 D3
100 mg

【원료약품 및 그 분량】1정 중

■ 유효성분:	
벤포티아민(KP) (타이아민염산염으로서 72.31mg)	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
푸마르산염(KP) (철로서 20mg)	60mg
파리독신염산염(KP)	100mg
시아노코발라민1000배산(KP) (시아노코발라민으로서 100μg)	100mg
제피아스코르브산(혈구) (아스코르브산으로서 95.96mg)	100mg
d-비오틴(USP)	100μg
폴산(KP)	100μg
핀토탄산칼슘(KP)	100mg
콜레칼시페롤과립(CP) (비타민D로서 1,000IU)	10mg
신화아연(KP) (아연으로서 16mg)	20mg
γ-오리자놀(KP)	2mg
이노시톨(KP)	100mg
유비데카린(KP)	2mg
우르소데옥시콜산(KP)	5mg
■ 첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유)	
■ 첨가제(타르색소): 청색4호, 적색40호, 황색203호	
■ 기타첨가제: 경질무수구산, 미강젤라틴로스, 바닐라디크론, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 오파드라이현색(03E28706), 저지탄산하이드록시프로필셀룰로스, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로스, 히프로멜로로스	

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육발달 - 구루병의 예방
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요하리)통, 어깨결림 등, 구각염(입꼬리), 구순염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로
3. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
4. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 철 함유제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 만 12개월 미만의 젖먹이

- (4) 혈액색소(혈당 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- (5) 신장(콩팥)결석 환자
- (6) 심한 증상의 신부전 환자
- (7) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose maldabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 안산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 재산제
 - (2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있다.
 - (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나)는대장염 등의 위장질환 환자
 - (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - (6) 신장(콩팥)장애 환자
 - (7) 저탄백혈증 환자
 - (8) 동종환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
 - (9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 땀은 번, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부름)부종증, 상복부부종증, 경련, 열, 혼수, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종(부기)
 - (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - (3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy : 말초신경 계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - (4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B6를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - (5) 과량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (6) 할알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【판매처】 **입양약품**

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

【소비자상담실】 080-700-8487

【포장단위】 60정, 120정

【제조자】 **Prime 한국프라임제약**

전라북도 완주군 봉동읍 완주신안로 100

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품은 사용되기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 개정일자이후 변경된 내용은 식약처 온라인 의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

개정일자 : 2018.03.09.(Rev.01)