

기능성 소화불량

휴모사정

(모사프리드시트르산염)

Humosa Tab.

휴모사정은 세계최초 Selective한 5-HT₄ agonist로 인하여 소화불량 증에 높은 효능을 자랑합니다.

[약리 작용] 휴모사정의 주성분인 mosapride가 선택적으로 5-HT₄ receptor를 사용하여 신경말단에서 아세틸콜린 유리를 촉진시켜 소화관 운동을 증진시키는데 탁월한 효과를 나타냅니다.

[특장점]**1) 5-HT₄ agonist의 뛰어남**

휴모사정은 주성분인 Mosapride는 dopamine D₂ 수용체의 차단작용이 없는 선택적 5-HT₄ agonist로서 CNS 부작용, 고르락틴혈증 등의 부작용이 없는 안전한 치료제입니다.

2) 우수한 복약순응도

휴모사정은 식전, 식후 효능차이가 없어 복약순응도가 높은 안전하고 효과적인 치료제입니다.

3) 혈류장애 질환 부담의 절감

휴모사정은 QT연장작용이 없어 심 부정맥의 부작용이 없습니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

모사프리드시트르산염(별규).....5.29mg

(모사프리드시트르산염 무수물로서 5mg)

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정**[효능·효과]**

기능성소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능이상(가슴쓰림, 오심, 구토)

[용법·용량]

통상 성인에게는 모사프리드시트르산염 무수물로서 1일 15mg을 3회 나누어 식전 또는 식후에 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]**1. 다음 환자에는 투여하지 말 것**

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

998례 중 40례(4.0%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사·연변(1.8%), 구갈(0.5%), 권태감(0.3%)등이 있다.

임상검사치에서는 792례중 30례(3.8%)에서 이상변동이 보였다. 주요 내용으로는 호산구증가증(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST(GOT), ALT(GPT), ALP 및 γ-GTP의 상승(각 0.4%)등이 있다.

1) 중대한 이상반응

극중간염, 간기능장애와 황달(각 0.1%미만) :

극중간염, 현저한 AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이르는 예도 있으므로, 충분히 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.

2) 기타 이상반응

과민증 : 발진, 두드러기, 때때로 부종

혈액계 : 때때로 호산구증가, 백혈구감소

소화기계 : 복부팽만감, 구강마비(혀와 입술을 포함), 때때로 설사, 연변, 구갈, 복통, 구역, 구토, 미각이상,

간장 : 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈 상승,

순환기계 : 때때로 심계항진

정신신경계 : 때때로 어지러움, 취형거림, 두통,

기타 : 떨림, 때때로 권태감, 중성지방의 상승,

3) 국내 시판후 조사결과

국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계 여부와 상관없이 1.9%(14례/745례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3%(10례/745례)이다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설사 각 4례, 묽은 변 3례, 오심 2례, 복부팽만, 소화불량, 유즙과생산, 권태, 발진 각 1례로 나타났다. 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 소화불량, 유즙과생산이 각 1례씩 보고되었다.

3. 일반적 주의

일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화관 증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 않는다.

4. 상호작용

본제의 소화관운동촉진작용은 콜린작동성 신경과의 관련성으로 인해 항콜린제(항산아트로핀, 브롬화부틸스코폴라민 등)와 병용 투여시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용 간격을 두는 등 병용에 주의해야 한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. (임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어있지 않다.)

2) 수유중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단한다. (실험동물에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있다.)

6. 소아에 대한 투여

소아 등에 대한 안전성이 확립되어있지 않다. (사용경험이 없다.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현된 경우에는 감량(예, 1일 7.5mg)하는 등 적절한 처치를 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

9. 기타

설치류에 임상통상용량의 100~300배(30~100mg/kg/일)을 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주)에 있어 종창(간세포선종 및 갑상선여포성 종양) 발생률의 상승이 나타났다.

【포장단위】 자사포장 단위

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자 상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

HUTECS

한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 남양읍 상신리 907-6

우수의약품제조관리기준
KGMP 작적지정업체

제조/외자: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 남양읍 상신리 907-6

제 조 자: 스카이뉴팜(주) 경기도 시흥시 정왕동 1234-3

설명서 작성일 120601