

에펠정

(에페리손염산염)

원료약품 및 그 분량 1정 중

에페리손염산염(별규).....50.0mg
 첨가제(등물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 스테아르산마그네슘(기원동물: 소, 사용부위: 우지)
 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽내피)

성상

흰색의 원형 당의정

효능·효과

- 근골격계질환에 수반하는 통증성 근육연축: 경간완충후군(목어깨팔꿈추구), 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경추척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수협착장애, 아급성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환

용법·용량

성인: 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여합니다.(먹습니다.)
 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증(심한증상)의 근육력증(근무력증) 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하여 주십시오.
 - 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)
- 부작용
 - 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 간장: 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 신장: 드물게 단백뇨(단백질이 섞인 오줌), BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 혈액: 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
 - 정신신경계: 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
 - 소화기계: 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈(목마름), 변비, 설사, 복통(배아픔), 드물게 복부팽만감, 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있습니다.
 - 비노기계: 드물게 요폐(소변축적), 요실금, 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다는 것 같지 않은 느낌)이 나타날 수 있습니다.
 - 전신증상: 때때로 두력감, 비틀거림, 전신관대감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
 - 기타: 때로 안면홍조, 드물게 발한(몸이 땀), 부종(부기)이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 이 약 투여중에 두력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감광(졸임) 또는 투여를 중지합니다.
 - 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 상호작용

이 약의 유사작용인 염산페니라손과 메토카르바몰을 병용(함께복용(사용))시 시조절장애(시각조절장애)가 나타났다는 보고가 있습니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.
- 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).
- 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의합니다.

포장단위

자사포장단위

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부서 작성일자(2012년 11월 28일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품 전자민원창구(ezdrug.kfda.go.kr)의 '의약품등 정보'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 의약품은 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011