

관관절염 원인치료제

다아신 캡슐

디아세레인 (DMOAD)

KGMP지정업소

전문 의약품

분류번호 : 399

디아신캡슐은 관절연골의 구성물질인 Proteoglycan파괴를 저해하여 관절연골을 보호하고 연골조직의 신진대사를 촉진시켜 관절염을 원인으로 치료하는 약물입니다.

디아신캡슐은 기존의 NSAIDs 제제와 화학구조가 전혀 다른 Anthraquinone 유도체로서 NSAIDs 제제에서 부작용으로 나타나는 위장장애를 극소화시킨 관절염 치료제입니다.

【성분 · 함량】

1캡슐 중

디아세레인 (KPC)60mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(1원동물소, 사용부위:우유)

첨가제(타르색소): 황색 203호

【성상】

황갈색의 내용물이 충전된 상부 흰색, 하부 황색의 경질캡슐

【효능 · 효과】

관관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

【용법 · 용량】

성인: 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할하여 식후 경구투여 한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 않 것.

1) 염증성 대장 질환 환자(궤양성 대장염, 크론병)

2) 장폐색 증후군 환자

3) 원인불명의 복통 환자

4) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자

5) 중증의 간부전 환자

6) 15세 미만의 소아

7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여한다).

2) 일부 및 수유부

3) 고령자(용량 감소가 필요하다.)

3. 이상반응

1) 소화기계: 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있다.

2) 피부: 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.

5. 상호작용

1) 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여한다.

2) 이노제와 병용투여시 이노작용이 약하게 증강될 수 있다.

6. 일부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다.

2) 이 약이 인체 내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나 모유 중으로 안트라퀴논 유도체가 소량 이행되므로 일부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7. 과량투여시의 처치

1) 증상: 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다.

2) 처치: 필요시 전해질 공급 등의 대증요법을 실시한다

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 3년

【포장단위】

30, 500캡슐

【변질 및 교환】

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다

■ 제조자 : (주)유영제약 · 충북 진천군 광혜원면 용소2길 33

■ 제조의뢰자 : 한국콜마(주) · 세종특별자치시 전의면 산단길 245

■ 판매처 : (주)김스제약 · 서울 마포구 월드컵로 28길 13

본 설명서 작성일자 이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

(주)김스제약 고객센터 070-8668-4688. 홈페이지 : <http://www.kimspharma.com>

작성년월일 : 2012.12.10

KDA121212

당신의 건강 파트너
김스제약