

전문의약품

광범위 항진균제

루코졸[®] 캡슐

(플루코나졸)

경동제약주식회사 1503S

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

광범위 항진균제

루코졸[®] 캡슐

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

전문의약품

분류번호:629

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

(플루코나졸)

도를 상당히 증가시킴을 보였다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않는다. (3) 아스테미졸: 이 약과 아스테미졸의 병용은 아스테미졸의 청소율을 감소시킬 수 있다. 아스테미졸의 혈장농도의 증가는 QT연장 및 드물게 Torsade de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 아스테미졸을 병용투여하지 않는다. (4) 피모지드: in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피모지드의 병용투여가 피모지드의 대사약제를 유발시킬 수 있다. 증가된 피모지드 혈장농도는 QT연장 및 드물게 Torsades de Pointes를 일으킬 수 있다. 이 약과 피모지드는 병용투여하지 않는다. (5) 퀴니딘: in vivo및 in vitro 실험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴니딘의 병용투여는 퀴니딘의 대사여제를 유발시킬 수 있다. 퀴니딘의 투여는 QT 연장과 드물게 Torsades de Pointes의 발생과 관련 있었다. 이 약과 퀴니딘은 병용투여하지 않는다. (6) 에리트로마이신: 이 약과 에리트로마이신의 병용은 심독성(QT간격 연장, Torsades de Pointes) 및 그에 따른 급성 심정지 위험 증가시킴 가능성 있다. 이 약과 에리트로마이신은 병용투여하지 않는다. (2) 이 약과 다음 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조절이 고려되어야 한다. 다른 약물이 플루코나졸에 미치는 영향 (1) 히드로클로로타이아지드: 건강한 지원자를 대상으로 한 약물동력학적 상호작용시험에서 이 약과 다화용량의 히드로클로로타이아지드를 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 상승하였다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노제제를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요하지 않다. (2) 리팜피산: 이 약과 리팜피산을 병용투여 시 이 약의 AUC가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌다. 그러므로 리팜피산과 병용 시 이 약의 증량을 고려해야 한다. 플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향 : 이 약은 강력한 CYP2C9과 CYP2C19의 억제제이며, 중증도의 CYP3A4억제제이다. 아래 언급한 관찰되고/입증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9, CYP2C19과 CYP3A4에 의하여 대사되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험성이 있다. 따라서 아래 약물들과 병용 시 신중함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 한다. 이 약의 긴 반감기 때문에 치료 중단 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4-5 일간 지속 된다. (1) 알펜타닐: 이 약과 알펜타닐을 병용투여 한 시험에서 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용적의 감소가 관찰되었다. 이 같은 작용의 가능성은 이 약의 CYP3A4억제에 있다. 알펜타닐의 용량조절이 필요할 수 있다. (2) 아미트리프틸린, 노르트리프틸린: 이 약은 아미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킨다. 이 약과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린/5-아미트리프틸린이 측정될 수 있다. 필요 시 아미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 한다. (3) 암포테리신 B: 감염상태의 정상 마우스와 결핵이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 암포테리신 B를 동시 투여했을 때 다음과 같은 결과를 보였다: C. albicans에 의한 전신감염에서는 항진균효과가 약간 더 관찰되었음, Cryptococcus neoformans에 의한 두개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, Aspergillus fumigatus에 의한 전신감염에서의 두 약물의 결합 작용, 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려진 바 없다. (4) 항응고제: 건강한 남자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 와파린 투여 후 프로트롬빈시간(2