

의약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

눈이 피로해지는 사람의 아이미루 40이엑스 골드 점안액

일반의약품
분류번호 : 131

[8종의 유효성분 배합]



트리플 비타민 처방



더블 아미노산 처방



눈의 침침함 조절



가려움, 충혈을 억제

☑ 비타민A ☑ 비타민D

☑ 비타민 B6

☑ 타우린

☑ L-아스파라긴산칼륨

☑ 네오스티그민메틸황산염

☑ 클로르페니라민말레산염

☑ 테트라히드로졸린염산염

[트위스트 캡의 개폐 방법]

캡 부분을 위로 해서 개폐하여 주십시오.

※ 용기의 중심을 누른 채로 개폐하면 용액이 튀는 경우가 있습니다. 용기의 측면을 잡고 개폐하십시오.


① 여는 방법

캡을 앞쪽으로
비웁니다.



② 닫는 방법

달락하는 소리가
날 때까지 누릅니다.



원료약품 및 그 분량

(이 약 1mL 중)	네오스티그민메틸황산염(JP)	-----	0.05	밀리그램
	레티놀팔미테이트(JP)	-----	330	아이.유
	테트라히드로졸린염산염(별규)	-----	0.1	밀리그램
	L-아스파라긴산칼륨(별규)	-----	10	밀리그램
	타우린(JP)	-----	1	밀리그램
	피리독신염산염(JP)	-----	0.3	밀리그램
	클로르페니라민말레산염(JP)	-----	0.3	밀리그램
	D-α-토코페롤아세테이트(별규)	-----	0.5	밀리그램

첨가제 : 봉산 트로메타몰, 에데트산나트륨수화물, 디부틸히드록시톨루엔, 연화나트륨, 폴리옥시에틸렌계면활성제, 폴리스ORB80, 프로필렌글리콜, I-멘톨, d-카파, d-보르네올, 수산화나트륨, 묽은 염산, 정제수

성상

특이한 냄새가 있는 무색 투명한 액이 투명한 밝은 연두색 플라스틱 용기에 든 점안(눈에 넣음)액

효능·효과

눈의 피로, 결막충혈, 수영 후 눈의 불쾌감 또는 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때, 자외선 및 기타광선에 의한 눈의 염증, 눈꺼풀의 짓무름, 하드콘택트렌즈를 착용시 불쾌감, 눈의 가려움, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

용법·용량

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다

△ 사용상 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - (2) 30개월 이하의 유아
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - (1) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 충혈을 일으킬 수 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - (2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
 - (3) 잘못하여 의복 등에 착색된 경우에는물로 세척하여 제거할 것.
 - (4) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로만 사용할 것.
 - (5) 소프트콘택트렌즈의 장착액으로, 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 말 것.
 - (6) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의할 것. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 말 것.
 - (7) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
 - (8) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 빨리 사용할 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 눈의 통증을 심한 사람
 - (2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상을 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 환자 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - (3) 녹내장 환자
 - (4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (5) 소아 : 경련을 유발할 수 있다.
 - (6) 프로필렌글리콜 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - (1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (2) 이 약의 투여에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 피부의 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (3) 이 약 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우
 - (4) 수일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
- 저장상의 주의사항
 - (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - (3) 오염(질똥 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

13 mL

- 만약 유통과정중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사와 상담하세요.
- 이 첨부문서 작성일자(2014년 03월 03일)이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ➡ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) ➡ (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

수입판매자 : 씨제이헬스케어주식회사

서울 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 11, 12층
고객행복센터 : 080-700-6802
<http://www.cjp.co.kr>

제조업체 : Lion Corporation

3-7, Honjo, 1-Chome, Sumida-Ku, Tokyo, Japan

제 조 자 : Nitto Medic Co., Ltd.

1-14-1, Yasuuchi, Yatsuo-Machi,
Toyama-City, Toyama, Japan

156325101 FD-121207
LD-140303