



한국다케다제약주식회사

분류번호:114 (해열·진통·소염제)

일반의약품

의약품을 사용하기 전에 이 첨부 문서를 주의깊게 읽고  
사용(복용)하시고 첨부문서는 의약품과 함께 보관하십시오.

# 화이투벤<sup>®</sup>큐 Q

## 코프연질캡슐

화이투벤 큐 코프 연질캡슐은 액상연질캡슐로 목 넘김이 부드럽고 약효발현시간이 빨라  
감기증상으로 부터 빠른회복을 도와주는 목 감기약 입니다.

**원료약품 및 그 분량** 이 약 1캡슐(920mg) 중

|                             |          |                         |        |
|-----------------------------|----------|-------------------------|--------|
| 아세트아미노펜(KP) .....           | 180.00mg | 노스카핀염산염수화물(KP) .....    | 4.00mg |
| 구아이페네신(KP) .....            | 41.66mg  | 트리프롤리딘염산염수화물(USP) ..... | 0.66mg |
| 덱스트로메토르판브롬화소산염수화물(KP) ..... | 8.00mg   |                         |        |

착색제(천연색소) : 치자청색소 (NO 타르색소)

### 성상

무색 내지 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 타원형 연질캡슐

### 효능·효과

감기의 제증상<sup>1)</sup>(코물, 코막힘, 재채기, 인후통<sup>2)</sup>, 기침, 가래, 오한<sup>3)</sup>,  
발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화



### 용법·용량

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

### 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

### 포장단위

10연질캡슐

화이투벤 큐 코프 연질캡슐은 어린이 의약품 오용<sup>1)</sup>으로 인한  
악물사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장  
(Children Resistance:CR)을 적용하였으며,  
반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



①  
캡슐을 따라  
자르십시오



②  
캡슐을 화살표  
방향으로 벗기면  
약이 나옵니다.

### 판매원

(주)한국다케다제약 | 서울시 강남구 테헤란로 98길 8  
제품문의 080-553-3300 www.takeda.co.kr

### 제조원

(주)알피코프 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

- 본의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 유통과정 중 잘못으로 사용기한이 경과되었거나  
제품이 변질, 변패, 오염 및 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하세요.

## 사용상의 주의사항

### 1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아<sup>※</sup>
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해거담제<sup>※</sup>, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염<sup>※</sup>용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아<sup>※</sup> 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아<sup>※</sup>에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아<sup>※</sup>, 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아<sup>※</sup>, 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 전측성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염<sup>※</sup>, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질질환, 신장<sup>※</sup>질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장장애, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨<sup>※</sup>곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람  
(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람  
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

### 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적<sup>※</sup>, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종<sup>※</sup>, 배뇨<sup>※</sup>곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증<sup>※</sup> 증상이 나타난 경우  
① 아나필락시스<sup>※</sup> : 복용후 바로 두드러기, 부종<sup>※</sup>, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란한 등이 나타날 수 있다.  
② 피부정맥안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적<sup>※</sup>, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.  
③ 천식  
④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.  
⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.  
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

### 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

### 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용<sup>※</sup>을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

### 용어해설

- 1) 제증상 : 여러증상 2)인후통 : 목구멍의 통증 3)오한 : 춥고떨리는증상 4) 진해거담제 : 기침가래약 5) 발적 : 총혈되어 붉어짐 6) 영아 : 젖먹이  
7) 비염 : 코염 8) 신장 : 콩팥 9) 배뇨 : 소변을 놓 10) 부종 : 붓기 11) 중증 : 심한증상 12) 아나필락시스 : 과민성쇼크 13) 오용 : 잘못사용

이 첨부문서 작성일자(2013년 1월 7일) 이후 변경된 내용은

www.takeda.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.

**화이투벤<sup>®</sup>큐<sup>Q</sup>**  
코프연질캡슐