



한국다케다제약주식회사

분류번호: 114 (해열·진통·소염제)

일반의약품

의약품을 사용하기 전에 이 첨부 문서를 주의깊게 읽고
사용(복용)하시고 첨부문서는 의약품과 함께 보관하십시오.

화이트벤[®]큐Q

연질캡슐

화이트벤 큐 연질캡슐은 액상연질캡슐로 목 넘김이 부드럽고 약효발현시간이 빨라
감기증상으로 부터 빠른회복을 도와주는 종합 감기약 입니다.

원료약품 및 그 분량 이 약 1캡슐(920mg) 중

아세트아미노펜(KP)	180.00mg	dL-메틸에페드린염산염(KP)	12.50mg
구아이페네신(KP)	20.84mg	덱스트로메토르판브로마수소산염수화물 (KP)	8.00mg
수도에페드린염산염(USP)	15.00mg	트리프롤리딘염산염수화물(USP)	0.66mg

착색제(천연색소) : 락색소 (NO 타르색소)

성상

무색 내지 적색의 투명한 내용물을 함유한 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

효능·효과

감기의 증상상 ¹⁾(코물, 코막힘, 재채기, 인후통 ²⁾, 기침, 가래, 오한 ³⁾,
발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화



용법·용량

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용


저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10연질캡슐

화이트벤 큐 연질캡슐은 어린이 의약품 오용¹⁾으로 인한
악물사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장
(Children Resistance: CR)을 적용하였으며,
반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



판매원

(주)한국다케다제약 | 서울시 강남구 테헤란로 98길 8
제품문의 080-553-3300 www.takeda.co.kr

제조원

(주)알피코프 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

• 본의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 유통과정 중 잘못으로 사용기한이 경과되었거나
제품이 변질, 변패, 오염 및 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.

• 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하세요.

사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사의 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아^㉔
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해거담제^㉔, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염^㉔용 경구제, 멸미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아^㉔ 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아^㉔에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아^㉔, 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아^㉔, 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 빈인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염^㉔, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장^㉔질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장장애, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨^㉔곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침.
발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적^㉔, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종^㉔, 배뇨^㉔곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증^㉔ 증상이 나타난 경우
① 아나필락시스^㉔: 복용후 바로 두드러기, 부종^㉔, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부정맥안종증군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴피사용해(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적^㉔, 화상과 같이 물질이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.
⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용^㉔을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

용어해설

- 1) 제증상: 여러증상 2)인후통: 목구멍의 통증 3)오한: 춥고떨리는증상 4)진해거담제: 기침기래약 5) 발적: 충혈되어 붉어짐 6) 영아: 젖먹이
7) 비염: 코염 8) 신장: 콩팥 9) 배뇨: 소변을 누 10) 부종: 붓기 11) 중증: 심한증상 12) 아나필락시스: 과민성쇼크 13) 오용: 잘못사용

이 첨부문서 작성일자(2013년 1월 7일) 이후 변경된 내용은

www.takeda.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.

화이투벤[®] 큐Q
연질캡슐