

일반의약품

의약품 사용하기 전에 이 첨부 문서를 주의깊게 읽고
사용(복용)하시고 첨부문서는 의약품과 함께 보관하십시오.



화이트벤[®] 싸플러스 캡슐

화이트벤 싸플러스 캡슐은 감기 증상으로부터의 회복을 도울 수 있는 아스코르브산이 함유되고
(성인 1일 복용량 기준 비타민C 약 500mg), 비타민 B₁, B₂ 이 첨가된 종합 감기약입니다.

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

유효성분:

아세트아미노펜(KP)	200 mg	카페인무수물(KP)	10 mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25 mg	티아민질산염(KP)	4.1 mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.5 mg	리보플라빈(KP)	2 mg
클로페라스타틴염산염(KP)	8 mg	아스코르브산(KP)	83.3 mg

첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호, 황색203호
기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 전호화전분, 캡슐, 콜로이드성아산화규소, 크로스카멜로스니트름, 히드록시프로필셀룰로오스

성상

이 약은 노란색의 과립이 충전된 상부 연주총색, 하부 담황색 경질 캡슐제입니다.

효능·효과

감기의 증상(여러 증상) (코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 가침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량

만 15세 이상의 어린이 및 성인: 1회 2캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다.
만 8세 이상 ~ 15세 미만 어린이: 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다.



저장방법

기밀용기, 실온보관 (~30°C)

포장단위

10캡슐/PTP

화이트벤 싸플러스 캡슐은 어린이의약품오용방지용
오인(오인)약물사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장
(Child-Resistance: CR)을 적용하였으며,
반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



제조사

셀트리온제약

충청남도 아산시 도고면 덕암산로 342(제1공장)
충청남도 아산시 도고면 덕암산로 381(제2공장)

제조외의자, 판매자

셀트리온제약

충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오염,
손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. (소비자상담실: 080-850-3611(~2) 소비자상담부)
※ 이 제품 설명서 작성일자 (하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.celltrionph.com), 의약품통합정보시스템
(http://nedrug.mfds.go.kr) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선3))에서 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 발생 시 한국약물안전관리에 피해구제를 신청할 수 있습니다.
(의약품부작용신고 및 피해구제 상담: 1644-6223)



사용상의 주의사항

1. 경고

- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 발진성 고열증후군(AEGF), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증후군(TEN)과 같은 중대한 피부반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000 mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000 mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
- MAO제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)제제(기침약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(젖먹이) 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(젖먹이) 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간질질환, 신장기능질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 볼)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 기부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여합니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 볼)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불면, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(아나)나(팔)시(과민성소크): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕부, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막인중후군(스티븐스-존슨증후군, 중독성표피괴사증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적·종혈되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈썹에 나타날 수 있습니다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.
⑤ 간질성발작: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타날 수 있습니다.
⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용량·용량을 잘 지킵니다.
- 정기간 계속 복용하지 않습니다.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.
- 복용시에는 음주하지 않습니다.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피합니다.
- 비르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 일교열을 투여한 환자는 다음의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

본 의약품에 대한 자세한 허가사항 및 이 첨부문서 작성일자(2022년 02월 10일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

