

생리통 / 근육통 / 관절통 / 요통

효과 빠른 파인펜

생약+양약 복합진통제

일반의약품

분류번호: 114

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

파인펜정은 해열, 진통, 소염작용을 하는 이부프로펜과 근육경련을 수반하는 통증을 완화해주는 작약·감초, 혈관확장에 의한 혈액순환 촉진으로 건위작용을 하는 육계·생강을 함유하고 있어 위장 장애를 개선한 효과적인 생약, 양약 복합진통제입니다.

● 원료약품 및 그 분량 : 1정(650mg) 중

이부프로펜(KP)	200mg
작약(KP)	170mg
감초(KP)	170mg
육계(KP)	170mg
생강(생규)	170mg
첨가제(타르색소) : 청색1호	

● 성 상 : 청색 장방형 필름코팅정

● 효능·효과

- 1) 두통, 치통, 발치(아를 뽑음)후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(아깨갈림), 타박통, 골절통, 염좌통(뺨통증), 월경통(생리통), 와상(상치통)의 진통
- 2) 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열

● 용법·용량

성인 및 만 15세 이상 1회 2정을 1일 3회 공복(빈 속)을 피하여 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 하며 1일 최대 6정(이부프로펜으로서 1,200mg)까지 복용할 수 있다.

● 사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 4) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

경남제약|주|
Kyung Nam Pharm. Co., Ltd.

첨부문서 작성연월일 : 2015. 02. 09

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다. 3) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기) 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 고령자(노인) 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 9) 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적충혈되어 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕 부진, 변비, 위통, 소화불량, 위부(상복부)불쾌감, 어지러움, 부종(부기) 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한) 증상이 나타난 경우 ① 속(아·피복시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부적미안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적충혈되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다. ⑤ 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것) ⑥ 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 복용하지 말 것 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 칼륨 함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용할 경우 복용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

- 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 포장단위 : 자사조장단위(외부포장에 표기)
- 제조사 : 경진제약사 경기도 이천시 울면 일성로406번길 6
- 제조의뢰자 : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기간이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인약도서관 「http://drug.mfds.go.kr」 의약품검색을 참조하시기 바랍니다.