



SINCE 1945

베아릴M[®]정 2/500mg

(글리메피리드/메트포르민염산염)

경구용 복합 혈당강제제

전문의약품

【원료약품 및 그 분량】 -1정 중-

글리메피리드(EP) 2mg
메트포르민염산염(USP) 500mg

【성 상】 흰색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】 인슐린 비의존성 당뇨병(제2형)환자에서 식이요법 및 운동요법과 병행하여
- 글리메피리드 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우
- 글리메피리드와 메트포르민 병용요법의 대체

【용법·용량】

이 약은 식사직전 또는 식사와 함께 1일 1~2회 투여합니다.

각 환자의 현재 치료요법, 유당증, 내약성을 고려하여 용량을 조절할 수 있으며, 이를 위해 적절한 혈당 모니터링이 이루어져야 합니다. 통상 저용량으로 치료를 개시하고 환자의 현재 복용 중인 약물과 혈당치를 고려하여 용량을 조절할 수 있습니다. 이 약은 임상시험에서 1일 초기 용량은 글리메피리드/메트포르민염산염 2mg/500mg이었으며, 혈당 모니터링 결과에 따라 점차 증강하여 글리메피리드/메트포르민염산염 8mg/2000mg까지 투여한 경험이 있습니다. 단일제 글리메피리드는 일반적으로 하루 4mg 이상의 용량을 투여했을 때 추가 효과는 거의 없지만, 몇몇 환자들은 8mg까지 증강시킴으로써 더 나은 대사조절을 보였습니다. 병용요법의 대체 요법으로 사용할 경우 현재 병용투여 받고 있는 글리메피리드 및 메트포르민염산염의 용법·용량에 근거하여 투여합니다. 이전 복용을 누락한 경우라도 다음 복용 시 1회 용량을 초과해 복용해서는 안 됩니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 심한 유산산증 또는 저혈당을 일으킬 수 있습니다.
- 심혈관계 사망률의 증가 위험: 경구용 항당뇨병약의 투여는 식이 단독요법이나 식이와 인슐린의 병용치료와 비교하여 심혈관계 사망률의 증가와 관련있다고 보고된 바 있습니다. 이러한 경고는 인슐린 비의존성 당뇨병 환자에서 혈당저하 약물이 혈관 합병증을 예방하거나 늦추는 효과를 평가하기 위해 University Group Diabetes Program(UGDP)에 의해 수행된 연구에 기초합니다. 5~6년 동안 식이요법과 규정된 양의 톨부타마이드(15g/day) 혹은 식이 요법과 규정된 용량의 펜톨린(100mg/day)을 투여받은 환자는 심혈관계 사망률의 비율이 식이요법만을 실시한 환자의 약 25배라고 UGDP에 보고하였으며, 이 두 투여군의 투여저하되는 결과를 가져왔습니다. 이러한 결과 해석에 대한 반대견이 있음에도 불구하고, UGDP 연구의 발견은 이러한 경고에 대한 합당한 기초를 제공합니다. 환자에게 이 약과 다른 형태의 치료의 잠재적 위험과 이익에 대해 주의시켜야 합니다. 이 연구에서는 설포닐우레아제 중 하나의 약물(톨부타마이드)과 비구아니이드제 중 하나(펜톨린)만이 포함되어 있지만, 각개의 약물 중 작용기전과 화학적 구조의 유사성이라는 측면에서, 이러한 경고를 다른 관련된 항당뇨병 약물에도 적용할 수 있는 점을 고려하여야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 인슐린-의존형type 1 당뇨병 환자(케톤혈증의 병력을 가진 당뇨병 환자), 당뇨병성 케톤혈증, 당뇨병성 혼수 또는 전혼수 환자, 심장 혹은 만성 대사성산증증
- 본제의 성분 또는 설포닐우레아제, 실폰아마이드계, 비구아니드계 약제에 대해 과민증의 기원력이 있는 환자
- 중증 간기능장애 환자 또는 혈액성분 환자에 대해서는 사용 경험이 없습니다. 중증 간기능 또는 신기능장애 환자에서는 최적의 혈당조절을 이루기 위해 인슐린요법으로의 전환이 권장됩니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 유산산증 일으키기 쉬운 상태의 환자, 유산산증의 병력이 있는 환자, 심혈관계 하혈(속), 급성심장색과 패혈증과 같은 상태로 부터 야기될 수도 있는 신기능 이상이나 신기능 부전(혈장 크레아티닌치가 1.5mg/dL 이상(남성), 1.4mg/dL 이상(여성), 혹은 비정상적인 크레아티닌 청소율인 경우)
- 방사선 요오드 요오드물질을 정맥내 투여하는 검사에: 정맥요오드조영술, 정맥관조영술, 혈관조영술, 조영제를사용한컴퓨터 단층촬영술 등을 받는 환자(급성신부전을 일으킬 수 있고, 이 약을 투여 받는 환자에서는 유산산증과 관련이 있습니다. 따라서 이러한 검사가 계획된 환자에서는 이 약을 적어도 투여 48시간 전에 중지해야 하고, 48시간 이후에 신기능을 재평가하고 정상으로 판명된 이후에만 치료를 재개합니다.) 이외에도 신기능을 변화시킬 가능성이 있는 급성 심장탈수, 중증의 감염, 쇼크 등이 있는 환자에게는 투여하지 않습니다.
- 중증 감염증, 수술전후(수술과정에 이 약은 수술 48시간 전에 일시적으로 중지해야 하고음식과 수액의 섭취에 제한이 없는 가벼운 수술은 제외) 환자의 경구적 섭취가 회복되고 신기능이 정상으로 판명된 후 다시 투여합니다.] 중증의 외상성상
- 영양불량상태, 기아상태, 쇠약상태, 뇌하수체기능부전 또는 부신기능부전 환자
- 간기능장애(술전반 전 기능은 유산산증의 몇몇 경우와 관련이 있기 때문에, 일반적으로 임상적 또는 실험실적으로 간 질환의 증가가 있는 환자에게는 이 약의 투여를 피해야 합니다.), 폐장색, 중증의 폐기능 장애 환자 및 기타 저산소혈증을 수반하기 쉬운 상태(심대부전 또는 호흡부전, 최근의 심근경색, 쇼크 등), 과도한 알코올 섭취자, 탈수증, 설사, 구토 등의 위장장애 환자
- 알코올치를 요하는 율혈성심부전 및 최근에 심근경색을 경험한 환자, 중증 순환장애가 있는 환자 또는 호흡장애가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

투약 첫 주에는 저혈당의 위험성이 높으므로 특히 주의 깊게 모니터링 할 필요가 있습니다. 저혈당을 일으킬 위험성이 높은 환자 조 상태는 다음과 같습니다.

- 비협조적 또는 협조불능(의식에서 보다 자주 나타남)환자
- 영양불량상태, 불규칙한 식사섭취, 식사를 거른 환자
- 근육운동과 탄수화물 섭취가 불균형을 이루는 환자, 격한 근육운동
- 알코올섭취자
- 신기능부전 환자(글리메피리드의 혈당강화 작용에 좀더 민감한 반응을 나타낼 수 있습니다)
- 중증 간기능부전 환자
- 이 약을 과량복용한 환자
- 비대사성 내분비계질환(예를 들어 갑상선이상, 뇌하수체전엽의 기능이상 또는 부신피질 부전환자); 이들 질환은 당대사, 또는 저혈당에 대한 신체의 역조절에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기타 약제와의 병용투여(6상작용 항 참조)
만약 이러한 저혈당 위험요인이 존재할 경우에는 용량이 또는 투약법 전체를 조정할 필요가 있을 수 있습니다. 투약오류 기타 질환이 발생한 경우 또는 환자의 생활양식이 바뀐 경우에도 그러합니다. 점진적으로 진행된 저혈당, 고령자, 저혈당경험 환자 또는 고갑상선병(갑상선 병용투여 받고 있는 환자의 경우에는 신체의 아드레날린성 역조절에 의한 저혈당의 재증상(5. 일 반적 투여의 정도)이 완화되거나 나타나지 않을 수 있습니다.

4. 이상반응

- 유산산증: 경고, 일반적 주의 참조
- 저혈당증: 경고, 일반적 주의 참조
- 소화기계: 위장관계 증상(설사, 구역, 구토, 복부 팽만, 식욕부진, 소화불량, 변비, 복통)은 메트포르민 투여시 나타나는 가장 일반적인 증상이며, 특히 치료의 초기에는 위약 투여군에 비해 메트포르민 단독투여 군에서 약 30% 정도 빈번하게 발생함니다. 이러한 반응은 일반적으로 일시적이며, 치료를 계속하는 동안 자연적으로 사라집니다. 때때로 일시적인 용량강화가 유용할 수 있습니다. 임상 시험에서는 약 4%의 환자가 위장관계 반응으로 메트포르민을 중지하였습니다. 치료초기부터 위장관계 증상은 용량과 관계없이 나타나므로, 용량을 점진적으로 증가시키거나, 이 약을 식사와 함께 복용함으로써 감소시킬 수 있습니다. 심각한 설사 그리고/혹은 구토는 탈수와 신기능 이상소혈증을 일으킬 수 있으므로, 이런 조건하에서는 이 약을 일시적으로 중지하여야 합니다. 이 약에 안정화가 이루어진 환자의 경우, 비특이적인 위장관계 증상은 치료에 기인한 것이 아니라 병발한 질병이나 유산산증의 가능성이 있습니다. 글리메피리드 투여시 때때로 구역, 구토, 상복부의 포만감이 증대 압박감, 복통, 설사 등의 소화기계 증상이 나타나는 경우가 있습니다.
- 특정장각제: 메트포르민 치료초기 동안, 약 3%의 환자가 불쾌하거나 금속맛을 호소하나, 보통 자연적으로 해결됩니다. 특히 투여초기에는 혈당치 변화에 따른 일시적인 시각부전이 나타날 수 있습니다.
- 피부반응 및 과민증: 때때로 알레르기 또는 알레르기 유사반응(예: 홍반, 가려움증, 두드러기, 발진 등)이 나타나는 경우가 있습니다. 이런 반응들은 대부분 경미하지만, 호흡곤란, 혈압강하 등을 수반한 심각한 반응으로 발전할 수 있고, 때로는 쇼크로 진행됩니다. 그러므로 두드러기가 나타날 경우에는 즉시 의사에게 알려야 합니다. 설포닐우레아, 실폰아미드 및 그 유도체와의 의과 약제와의 증상이 일어날 수도 있습니다.
- 다음의 혈액학적 이상이 나타날 수 있습니다: 드물게 혈소판감소증, 매우 드물게 백혈구감소증이나 율혈성빈혈, 적혈구감소증, 과립구감소증, 무과립구증, 범혈구감소증이 나타날 수 있으며 다른 설포닐우레아제 약제에서 재생혈량성 빈혈이 나타났다는 보고가 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 시판 후 사용경험에서 빈도는 알려져 있지 않지만, 혈소판 수 10,000/㎕ 미만 및 혈소판감소성 자반증을 동반하는 심한한 혈소판소증이 보고되었습니다.

7) 메트포르민을 정기간 복용해온 환자에서서 비타민 B₁₂의 혈장농도가 감소하였습니다. 혈장 엽산 농도는 유익적으로 감소하지 않았습다. 그러나 단지 거대적구성 빈혈이 이 약 투여와 관련하여 보고되었고, 신경병의 증상이 증가되지는 않았습다. 따라서 혈장 B₁₂값을 적절하게 모니터링하거나, 정기적으로 비경구적인 B₁₂ 보충을 고려해야 합니다.

8) 간장: 경우에 따라 간내 효소 증가, 간기능 손상(예:담분비장애, 황달) 및 간염이 나타날 수 있으며 간기능부전에 이를 수 있습니다.

9) 기타: 매우 드물게 알레르기성 혈관염, 피부의 광과민증, 혈청니트륨 농도의 감소 등이 나타날 수 있다고 알려져 있습니다.

위에서 열거한 이상반응 또는 기타 바람직하지 못한 반응, 예상치 못했던 변화 등이 나타날 경우에는 의사 또는 약사에게 알려야 합니다. 중증 저혈당, 혈액상의 특징한 변화, 중증 알레르기 반응 또는 알레르기 유사반응, 간부전 등도 몇몇 이상반응은 특정 상황에서 생명을 위협할 수도 있으므로, 돌발적이거나 심각한 반응이 나타날 경우에는 즉시 의사에게 알리고 지시기 있을 때까지 복용을 중지합니다. 국내에서 실시한 제삼 및 고령 3상 임상시험에 의하면 본 제의 복용으로 인해 나타난 약물이상반응 중 기증에 알려진 글리메피리드 및 메트포르민의 이상반응외에 예측되지 않은 약물이상반응은 관찰되지 않았습다.

메트포르민 단일제> 소아에서의 이상반응: 소규모 소아 코호트인 10~16세 연령의 환자에 1년 동안 메트포르민을 투여한 임상시험 뿐만 아니라 발표된 그리고 시판 후 조사결과에서 보고된 이상반응은 그 특성 및 심각도 측면에서 성인에서 보고된 이상반응과 유사했습니다.

10) 국내 시판 후 조사

국내에서 제삼사를 위하여 6년 동안 인슐린 비의존성 당뇨병(제2형)환자 1235명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과와 유해사례 발현율은 인과관계와 관계없이 2.76%(34명/1235명, 35건)로 보고되었습니다. 저혈당증 0.8%(10명/1235명, 10건), 복통 0.57%(7명/1235명, 7건), 복부팽만 0.49%(6명/1235명, 6건), 구토, 소화불량 각각 0.16%(2명/1235명, 2건), 전립선비대, 두근거림, 어지러움, 설사, 구역, 다리부종, 심정지, 직장암증 각각 0.08%(1명/1235명, 1건)이었습니다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유해사례인 약물유해반응 발현율은 2.02%(25명/1235명, 26건)로 저혈당증 0.81%(10명/1235명, 10건), 복부팽만, 복통 각각 0.49%(6명/1235명, 6건), 두근거림, 구토, 소화불량, 어지러움 각각 0.08%(1명/1235명, 1건)로 보고되었습니다. 중대한 유해사례로는 심정지, 직장암증 각각 0.08%(1명/1235명, 1건)이었으며 이 약과 인과관계는 없었습니다. 예상하지 못한 유해사례는 소화불량 0.16%(2명/1235명, 2건), 전립선비대, 다리부종, 직장암증 각각 0.08%(1명/1235명, 1건)이었으며 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유해사례인 약물유해반응은 소화불량이었습니다.

- 글리메피리드 단일제(경구)의 국내 시판 후 조사 결과

국내에서 제삼사를 위하여 6년 동안 12,066명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 유해사례 발현율은 인과관계와 관계없이 1.2%(149명/12,066명, 181건)로 보고되었습니다. 저혈당증 0.75%(90/명/12,066명, 102건)로 가장 많았고 그 다음은 한기증(여지름) 0.68%(10명/12,066명, 10건), 간기능이상 0.07%(8명/12,066명, 8건), 복통 0.06%(7명/12,066명, 7건)의 순으로 나타났습니다. 이중 사전 전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 유해사례로 관절통, 소화불량, 얼굴부종이 각 2건, 발기불능, 탈모, 인면통증, 위염이 각 1건씩 보고되었습니다.

5. 일반적 주의

- 저혈당증: 설포닐우레아제 약물을 투여했을 때 초기에 성공적으로 대체했음에도 불구하고 저혈당이 재발할 수 있습니다. 그러므로 의사 또는 약사는 환자를 세심하게 관찰해야 합니다. 저혈당증의 증상으로는 두통, 심한 배고픔, 구역, 구토, 피로, 수면, 무력감, 졸림, 수면장애, 불안정, 공격성, 집중 장애, 혼수, 빈혈 이상, 우울감, 착란, 언어장애, 외상성출혈, 시각이상, 떨림, 마비, 감각장애, 어지러움, 자각지각 불능, 섬망, 뇌성경련, 의식 소실, 혼수, 악한 호흡, 느린 맥박이 있습니다. 또한 발한, 추축한 피부, 발한, 빠른 맥박, 고혈압, 두근거림, 협심증, 심부정맥과 같은 아드레날린성 역조절 증상이 함께 나타날 수 있습니다. 심한 저혈당의 임상 증상은 뇌졸중(stroke)과 유사할 수 있습니다. 심한 저혈당의 경우에는 의사의 즉각적인 처치 및 추가관찰이 필요하고, 경우에 따라서는 입원치료가 필요합니다. 저혈당은 당글루코즈 또는 설탕, 예를 들어 설탕물당어, 당이 첨가된 과일주스, 당이 첨가된 차 등을 섭취함으로써 대부분 즉시 조절됩니다. 이를 위해 환자는 최소 20그램 정도의 당을 항상 휴대하여야 합니다. 저혈당의 위험성, 증상 및 치료, 저혈당 발생소인을 환자 및 환자가족에게도 설명합니다. 합병증을 피하기 위해 다른 사람의 도움을 필요로 할 수도 있습니다. 인공감미제는 저혈당을 조절하는데 효과가 없습니다.
- 유산산증: 유산산증은 드물기는 하나 심각하며, 이 약의 치료 조 메트포르민의 축적에 의해서 나타나는 대사성 합병증입니다. 발생한 경우에 있어서는 50%가 치명적입니다. 유산산증은 조직의 유산염 관련자하와 저산소증을 포함하는 병리생리학적 상태와 결부되어 나타날 수 있습니다. 유산산증은 혈중 유산농도 증가(5mmol/L 이상), 혈중 pH 저하, 음이온간의 차이가 늘어나는 전혈청 불균형과 유산/투루메이트의 비가 증가하는 것을 특징으로 합니다. 이 약이 유산산증의 원인이라고 여겨지는 경우, 혈중 농도는 일반적으로 5mg/L 미만인 것으로 나타납니다. 메트포르민을 투여 받은 환자에 있어 유산산증의 발현에 대한 보고는 매우 적습니다(연간 환자 1,000명당 약 0.03건, 치명적인 경우는 연간 환자 1,000명당 약 0.05건). 보고된 경우는 주로 많은 내-외과적인 문제가 병립된 당뇨와 많은 약물의 복합투여 등의 상태에서, 내인적 신장질환 환자 신장 관련자하를 포함하는 신기능이 유기하게 저하된 당뇨병 환자에게 일시적으로 발생된 것입니다. 유산산증의 위험은 신기능 저하의 정도와 환자 나이에 따라 증가 됩니다. 따라서 유산산증의 위험은 이 약을 투여하는 환자의 신기능을 정기적으로 모니터링하고, 최저 유효량을 투여함으로써 유익적으로 저하될 수 있습니다. 덧붙여 이 약은 저산소환자(탈수, 패혈증과 관계된 중증의 심부전 환자)를 즉시 중지해야 합니다. 순산된 신기능은 유산 배설능력을 유지시킬 수 있으므로 일반적으로 간질환의 임상적 혹은 실험실적 증가가 있는 환자의 경우 이 약을 피해야 합니다. 알코올은 이 약이 유산대사에 영향을 미치게 할 가능성이 있으므로, 이 약을 투여받는 동안 급성 혹은 만성적인 알코올의 과량섭취는 조심해야 합니다. 또한 이 약을 혈관질환 소인자에게거나 수술전에는 일시적으로 투여중지하도록 합니다. 유산산증의 시작은 때때로 구별이 어렵고 권대, 근육통, 호흡 혼동, 의식 장애의 증가와 비특이적 복부 통증과 같은 비특이적 증상들을 수반합니다. 체온저하, 저혈당과 관련된 산증을 수반하는 기립성 사부정맥이 나타날 수도 있습니다. 환자와 의사는 이러한 증상의 가능한 중요성에 대해 알고 있어야 하고, 환자는 만약 증상이 나타나거나 있는 경우, 의사에게 즉시 알리도록 교육받아야 합니다. 혈장 전해질, 케톤체, 혈당, 혈중 pH, 유산농도와 이 약의 혈중 농도도 유산산증을 확인하는데 유용할 수 있습니다. 일단 환자가 이 약 어떤 용량에 안정화되면, 메트포르민 치료 초기에 흔히 나타나는 일반적 위장관 증상은 약물과 관련된 가능성이 적습니다. 이 후에 할 발병은 위장관 증상은 유산산증이나 다른 심각한 저혈당 때문일 수 있습니다. 이 약을 투여받았던 환자의 공식적 정맥 혈당농도가 정상치의 상한 이상이며, 5mmol/L 이하인 경우, 유산산증이 임박했다는 것을 나타내지 않으며, 잘 조절되지 않은 당뇨병이나 비만, 저산전 욕제 활동 혹은 감염를 다루는데 있어 기술적인 문제와 같은 다른 조건으로 설명이 가능할 수 있습니다. 제삼조사에서 유산산증(케톤농도와 케톤혈액)의 증상이 없는 대사성 산증이 나타나는 당뇨병환자에게 약성해할 수 있습니다. 유산산증은 입원치료를 해야만 하는 의학적 위급상황입니다. 이 약을 투여한 환자에서 유산산증이 일어난 경우, 약물을 즉시 투여 중지하고 즉각 일반적인 보조 요법을 실시해야 합니다. 이 약은 투약이 가능하기 때문에(좋은 혈액역태학적 조건에서 170mL/min)의 청소율) 즉각적인 혈액 투석은 산증을 정상화하고 축적된 메트포르민을 제거하기 위해 추천됩니다. 이러한 처치는 때때로 즉각적인 증상 호전과 회복을 가져옵니다.
- 최적의 혈당조절 상태를 이루기 위해서는 이 약의 규칙적인 복용뿐만 아니라 식이요법·운동요법 그리고 필요한 경우 체중감량 등을 병행해야 합니다. 혈당조절이 충분히 이루어지지 않는 상태(고혈당의 임상징후는 빈뇨, 갈증, 구갈, 피부건조 등)입니다.
- 투약을 시작할 때 의사 또는 약사는 이 약의 효과 및 위험성, 그리고 식이요법·운동요법과 병행할 때 이 약의 효과 등을 환자에게 알려야하고, 또한 환자의 적극적인 협력이 중요하다는 것을 강조해야 합니다.
- 모든 당뇨병 치료의 반응은, 정상적인 범위로 수치를 강하시킬 목적으로 공복 시 혈당과 당화 혈색소 수치를 정기적으로 측정하여 모니터링해야 합니다. 용량 결정 초기에는 치료 반응을 결정하는데 공복시 혈당을 사용할 수 있습니다. 따라서 혈당과 당화 혈색소 모두 모니터링되어야 합니다. 당화 혈색소치는 장기간 조절을 평가하는데 특히 유용합니다.
- 다른 의사 또는 약사에게 치료받을 경우(예를 들어 입원시, 사고후, 공휴일에 아플때 등) 환자는 자신의 당뇨병상태 및 이전의 투약경험을 이들에게 알려야 합니다.
- 예외적인 스트레스 상태(예: 외상, 수술, 발열성 감염증)에서 혈당조절이 악화될 수 있으므로, 적절한 혈당 조절 상태를 유지하기 위해 일시적으로 인슐린요법으로 전환할 수도 있습니다.
- 투여하는 경우에는 소량부터 시작하여, 혈당, 요당을 정기적으로 감시하여또한 당화 혈색소의 비율을 규칙적으로 측정하는 것도 권장됩니다. 약제의 효과를 확인하고 효과가 불충분할 경우에는 속히 다른 치료법으로 바뀔니다.
- 특히 투여초기, 투약약물을 변경한 후, 또는 이 약을 규칙적으로 복용하지 않았을 때 저혈당 또는 고혈당에 기인한 민첩성장애, 행동장애 등이 나타날 수 있으며, 이로 인해 운전능력, 기계조작능력 등에 영향을 줄 수 있습니다.
- 신기능에 대한 모니터링: 메트포르민은 신장으로 대부분 배설된다로 알려져 있고, 이 약의 축적과 유산산증의 위험은 신기능의 부전 정도에 따라 증가됩니다. 따라서, 나이에 따라 정상 신장치 이상의 혈장 크레아티닌 값을 갖는 환자는 이 약을 투여하면 안됩니다. 고령자에 있어 노화는 신기능 저하와 관련이 있기 때문에 주의하여 적절한 혈당 조절 요법을 얻는 최소용량을 설정해야 합니다. 고령자는 정기적으로 신기능을 모니터링해야 하고, 일반적으로 최대 용량으로 설정하지 않습니다. 이 약은 치료 시작 전과 그 후 적어도 1년에 1회는 신기능 검사를 하여 정상인지 확인하여야 합니다. 신기능 부전의 발현이 예상되는 환자는 신기능을 더 자주 평가하고 신기능 부전의 징후가 있을 때에는 이 약의 투여를 중지합니다.
- 신기능이나 이 약에 영향을 끼칠 수 있는 약물과의 병용 투여: 신기능에 영향을 끼칠 수 있거나 위약적인 혈액 동태학적 변화를 야기시키거나 신세균 배출로써 배설되는 양이는 약물과 같이 이 약에 영향을 끼칠 수 있는 약물과의 병용투여는 주의해서 사용해야 합니다. 항고혈압제나 이뇨제 치료를 시작했거나 NSAD 투여 초기와 같이 신기능이 감소될 가능성이 있는 경우에도 특별한 주의가 필요합니다.
- 당뇨병 유사증상: 제2형 당뇨병의 진단이 확립된 환자에 대하여만 적용을 고려합니다. 당뇨병 이외에도 내당능 이상, 요당양성 등 당뇨병 유사증상(신당성 당뇨, 노인성 당대사 이상, 갑상선 기능 이상 등)을 가진 질환이 있는 것에 유익합니다.
- 투여 조의 조절: 투여 중에 투여가 필요 없게 된 경우나, 강림이 필요한 경우 또는 환자의 약학, 감염증의 위험성 등에 의해 효과가 없게 되거나 불충분하게 된 경우가 있으므로, 식사 섭취량, 체중변화의 추이, 혈당치, 감염증의 유무 등에 유익하여 투여 지속의 여부, 투여량, 투여의 선택 등에 유익합니다.
- 저산소증 상태: 어떠한 원인에 의한 심혈관계 하혈(속), 급성 율혈성 심장마비, 급성 심장색과 저산소증으로 특징지을 수 있는 다른 조건은 유산산증과 연관되어 있고 또한 신외성 질소혈증을 일으킬 수 있습니다. 이 약 치료를 받는 환자에서 이러한 일이 일어난다면, 약물을 즉시 투여 중지하여야 합니다.
- 알코올 섭취: 알코올은 유산 대사에 대해 이 약이 영향을 미치게 한다고 알려져 있습니다. 따라서 이 약을 투여하는 동안 급

성 혹은 만성적인 알코올의 과량섭취는 경고해야 합니다.

- 비타민 B₁₂: 임상적 증후 없이, 20주 동안 지속된 임상시험에서 이 약의 성분 중 메트포르민을 투여받은 환자의 약 7%에서 시험 전에 정상 혈당 비타민 B₁₂값이었던 것이 정상 이하로 감소하는 것으로 관찰되었습니다. 그러나, 이러한 감소는 B₁₂ 내부 인자 복합체로부터 B₁₂흡수를 방해하기 때문에 가능하고, 빈혈과의 연관성은 거의 없으며, 이 약의 투여 중지 나 비타민 B₁₂를 보충함으로써 빠르게 회복됩니다. 이 약을 투여 받은 환자는 매년 혈액학적 수치들을 검사해야 하며, 명백한 비정상치는 즉시 연구되고 관리되어야 합니다. 특정 개인(비타민 B₁₂나 칼슘 섭취 혹은 흡수가 부적절한 사람들은 정상 이하로 비타민 B₁₂값이 감소할 소인이 있습니다. 이러한 환자는 2~3년 간격으로 일반적 혈당 비타민 B₁₂ 측정을 하는 것이 유용할 수 있습니다.
- 전에 조절되었던 당뇨병의 임상적 상태의 변화 : 실험적 비정상이나 임상적질환 (특히, 피로, 잘 정의되지 않은 질환)이 발현된, 전에 메트포르민 제제로 당뇨병이 잘 조절되었던 환자는 즉시 케토산증이나 유산혈증의 발현에 대해 평가해야 합니다. 혈당 전혈액, 케톤체, 혈당에 대해 검사하고, 만약 나타났다면 혈당 pH, 유산, 피루베이트와 메트포르민염산염의 농도에 대해서도 검사합니다. 만약 어떠한 형태의 산증이 나타났다면 메트포르민염산염을 즉시 투여 중지하고 다른 적절한 올바른 검사를 시작합니다.
- 혈당조절의 실패 : 어떤 당뇨병 치료법으로 안정화된 환자가 발열, 경련, 감염 또는 수술과 같은 스트레스에 노출되면 일시적으로 혈당조절에 실패할 수 있습니다. 이러한 시기에는 이약의 투여를 중지하고, 일시적인 인슐린 투여가 요구될 수 있습니다. 메트포디염산염과 설포닐우레아 요법으로 2차적 실패가 되었다면, 인슐린 요법을 시작하는 것이 필요할 수 있습니다.
- 특정 직업의 환자 : 드물게 심한 유산산증, 중증의 자연성 저혈당을 일으킬 수 있으므로 고소작업, 자동차 운전 등에 중사 하는 이는 환자에 투여할 경우에는 주의합니다. 또한, 유산산증 및 저혈당에 대한 주의에 대하여 환자 및 그 가족에게 충분히 철저히게 주의시킵니다.
- 환자를 위한 정보 : 환자들에게 이 약의 안전성과 유효성 및 대체요법에 대해서도 알려야 합니다. 환자는 규칙적인 식사와 함께 지시된 식이요법을 준수하고, 규칙적으로 운동하며, 혈당, 당화 혈색소, 신기능, 혈액학적 수치 등 임상실험실적 검사를 정기적으로 실시해야 합니다. 또한 비만환자는 저열량 식이를 계속해야 합니다. 의사는 이 약의 치료와 관련된 유산산증의 위험, 그 증상, 발생 조건을 경고 및 주의에 나온 바와 같이 환자에게 설명해주어야 합니다. 환자들은 원인을 알 수 없는 호흡곤란, 근육통, 피로, 졸음 또는 다른 비 특이적 증상이 발생할 경우, 이 약을 즉시 중지하고 의사에게 알려드려도 지시해야 합니다. 일단 환자가 이 약의 어느 용량에 안정되면, 메트포르민 치료 개시 시에 흔히 나타나는 위장관계 증상은 약물과 관련된 가능성이 적습니다. 이 후에 발생하는 위장관계 증상은 유산산증 또는 다른 심각한 질환에 기인할 수 있습니다. 의사는 저혈당증의 위험, 그 증상, 발생 조건 등을 환자와 가족에게 설명해야 합니다. 이 약을 투여받은 동안 급성 또는 만성적인 과산혈 알코올 섭취를 하지 않도록 알려주어야 합니다.
- G6PD 결핍 환자가 설포닐우레아계 약물을 복용하면 용혈성 빈혈을 일으킬 수 있습니다. 글리메피리드는 설포닐우레아계에게 속하므로 G6PD 결핍 환자에게 투여 시 주의해야 하며 비설포닐우레아계 약물로의 대체를 고려해야 합니다.

6. 상호작용

글리메피리드

이 약투여중에 다른 약제를 병용투여하거나 다른 약제 복용을 중단한 환자에게 혈당조절이 변할 수 있습니다. 이 약 또는 기타 설포닐우레아계 약제의 사용 경험에 의하면 다음과 같은 상호작용을 고려하여야 합니다.

- 이 약은 cytochrome P4502C9(CYP2C9)에 의해 대사됩니다. 그러므로, 이 약과 CYP2C9 유도물질 (예: 리팜피진) 또는 억제제(예: 플루코나졸)를 병용투여할 경우에는 이러한 사항이 고려되어야 합니다.
- 혈당강화작용을 증가시키는 약제: 인슐린제제, 기타 경구용 혈당강화제, 비스테로이드성 소염제, ACE억제제, 알로푸리놀(allopurinol), 단백동화스테로이드제, 남성호르몬제, 클로람페니콜(chloramphenicol), 쿠마린계 약제, 시클로스포타이드(cyclosporinoid), 디소프라미드(disopyramide), 펜툴루라민(fenfluramine), 페니나졸(fenylmaride), 플루로세틴(flucetaine), 구아니데틴(guanethidine), 이포스포미드(losartamide), MAO억제제, 미코나졸(miconazole), 플루코나졸(flucanazole), 파라아미노살리실산(para-aminosalicylic acid), 펜툴사밀린(고용량을 비경구투여할 경우, 페닐부타존(phenylbutazone), 아자프로파존(azapropazone), 옥사펜타존(oxyphenbutazone), 프로베네시드(probenecid), 퀴놀론계 항균제, 살리실산제, 살린피라존(sulinyprazone), 클레라스로마시딘(clantrinofurin), 살몬아미드(sulfinamide), 테트라스아미드류에 항생제, 트리도쿠알린(tricoualine), 트로포스파미드(trostanamide), 고교강산 억제제.
- 혈당강화작용을 감소시키는 약제: 아세타르톨라미드(acetazolamide), 바르비탈산계 약제(barbiturates), 코르티코스테로이드제, 디아옥사이드(diazoxide), 이노제, 에피네프린(아드레날린)제, 기타 교감신경통분제, 글루카곤(glucagon), 항히제(장기간 복용), 나르티산교감경을 투여할 경우, 에스트로겐(estrogens), 프로게스테온(progestogens), 경구용피임약, 페도타이진계 약제(phenothiazines), 페니토인(phenytoin), 리팜피진(ritampirin), 갑상선호르몬제, 클로로프로마진, 이소니아지드
- 혈당강화작용을 증가 또는 감소시키는 약제 : H₂수소염길해제, 클로니딘(clonidine), 레세르핀(reserpine)
- β-차단제는 내당능을 저하시킵니다. 당뇨병 환자에게 내당능 저하는 대사조절을 변화시킬 수 있습니다. β-차단제는 저혈당을 일으킬 위험을 증가시킬 수 있습니다.(역조절 실패에 기인함)
- 저혈당을 위한 인체의 아드레날린산 억조절 장수를 감소 또는 차단시키는 약제: 교감신경 차단제, 예 : β-차단제, 클로니딘(clonidine), 구아니데틴(guanethidine), 레세르핀(reserpine) 등
- 급성 또는 만성 알코올 섭취는 이 약의 혈당강화작용을 예상할 수 없는 방향으로 증가 또는 감소시킬 수 있습니다.
- 이 약의 병용투여에 의해 쿠마린계 항응고제의 작용이 증가 또는 감소할 수 있습니다.
- 임습산 흡착제 : 콜레세비람(Colestesvelam)은 글리메피리드에 결합하여 위장관계에서 글리메피리드의 흡수를 감소시킵니다. 콜레세비람(Colestesvelam)을 투여하기 최소 4시간 전에 글리메피리드를 복용했을 때는 상호작용이 관찰되지 않았습니다. 다. 그러므로 콜레메피리드는 콜레세비람(Colestesvelam)을 투여하기 최소 4시간 전에 복용해야 합니다.

메트포르민

- 다음 약제와 병용에 의해 유산산증이 일어날 수 있으므로 이것과 병용할 경우에는 환자의 상태를 충분히 관찰하고 투여합니다.
 - 요오드 병증, 신독성이 강한 항생물질(겐타마이신 등)
- 다음 약제와 병용에 의해 혈당강화 작용이 증가 또는 감약될 수 있으므로 병용하는 경우에는 혈당치 및 다른 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 투여합니다.
 - 혈당강화작용을 증가시키는 약제 : 인슐린제제, 설포닐아미드계 및 설포닐우레아계 제제, 메글리타이드계(레파글리리드 등), 알파-글리코시타제 저해제(아카보즈), 단백동화스테로이드, 구아니데틴, 살리실산제(아스피린 등), β-차단제,프로프라놀롤 등), 모노아민산화 효소저해제, 안지오텐신 전환 효소 억제제
 - 혈당강화작용을 감소시키는 약제 : 에피네프린, 교감신경약, 부신피질호르몬, 갑상선호르몬, 난포호르몬, 에스트로겐, 경구용피임약, 치아자트과 기타 이노제, 피라진 아미드, 이소니아지, 니코틴산, 페도타이진계 약제, 페니토인, 칼슘채갈길해제, β₂-작용제,살부타롤, 포도테를 등)
- 글리부라이드 : 인슐린 비의존성 당뇨병인 환자에 대한 단회투여 연구에서 메트포민염산염과 글리부라이드의 병용 투여는 메트포민염산염의 약물 동력학적 혹은 약물 동태학적 성질에 변화를 일으키지 않았습니다. 글리부라이드의 AUC와 Cmax 가 감소하는 것이 관찰되었으나, 편차가 큼니다. 이 연구에서 단회 투여의 성격과 메트포민염산염의 혈액 농도와 약물 동태학적 효과간의 상관관계가 없는 것은 이런 상호 작용의 임상적 중요성이 불명확하다는 것을 나타냅니다.
- 푸로세미드 : 건강한 사람에게 단회 투여로 메트포민염산염과 푸로세미드의 약물 상호작용에 대한 연구는 병용투여에 의해 각 물질의 약물 동력학적 수치들이 영향을 받는다는 것을 나타냈습니다. 푸로세미드는 메트포민염산염의 신장 청소율의 유의적인 감소없이 이 약의 혈당농도를 증가시키며, 혈중 Cmax를 22%, 혈중 AUC를 15% 증가시켰습니다. 메트포민염산염과 함께 투여했을 때, 단일투여에 비해 푸로세미드의 Cmax와 AUC가 각각 3%와 12% 감소되었으며, 푸로세미드의 신장 청소율의 변화없이 최종반감기를 32% 감소시켰습니다. 만성적으로 메트포민염산염과 푸로세미드를 병용투여시 상호작용에 관한 유용한 정보는 없습니다.
- 니페디핀 : 정상인 건강한 자원에서 단회투여로 메트포민염산염과 니페디핀의 약물 상호작용에 대한 연구는 니페디핀과의 병용투여가 이 약의 혈장 Cmax와 AUC를 각각 20%와 9% 증가시키며, 노출 배설을 증가시켰다. Tmax와 반감기는 영향이 없습니다. 니페디핀은 메트포민염산염의 흡수를 촉진시킵니다. 메트포민염산염은 니페디핀에 최소한의 효과를 나타냅니다.
- 양이온성 약물 : 이론적으로 신세관 분비로서 배설되는 양이온성 약물(예를 들어 아밀로라이드, 디곡신, 모로핀, 프로카인아이드, 퀴니딘, 퀴닌, 라니티딘, 트리암테렌, 트리에토프라미드 반코마이신)은 일반적인 신장세뇨관 이동계에 대한 경쟁으로서 메트포민염산염과 작용할 가능성이 있습니다. 정상인 자원에 대한 단회 및 다회 투여시에서 관련된 메트포민염산염과 시메티딘간의 상호작용에 대한 연구는 메트포민염산염의 최대 혈장 농도와 전체 혈중 농도를 60% 상승 시키고, 혈당과 전혈액의 메트포민염산염 AUC를 40% 증가시켰습니다. 단회 투여시 배설 반감기에는 변화가 없었습니다. 메트포민염산염은 시메티딘의 약물동력학에는 아무런 영향도 끼치지 않았습니다. 이러한 약물상호작용이 이론적인 여지가 있지만(시메티딘 제와, 구위세뇨관 분비계를 통해 배설하는 양이온성 약물을 복용하는 환자에게는 자세한 환자 모니터링과 메트포민염산염과 있는 상호작용이 있는 약물의 용량조절이 추천됩니다.
- 기타 : 건강한 자원에 대한 단회 병용 투여 연구에서, 메트포민염산염과 프로프라놀롤, 메트포민염산염과 이부프로펜의 약물동력학적 성질은 서로 영향을 받지 않습니다. 메트포민염산염과 혈장단백질과 결합하는 것은 무위해도 좋을 만큼 이므로, 혈장 단백질과 광범위하게 결합하는 설포닐우레아와 비교할 때, 살리실산, 설포아미드, 클로람페니콜과 프로베네시드와 같이 단백질과 다량 결합하는 약물과는 상호작용이 적습니다.

7. 입부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험에서 기형형성 작용에 대한 보고가 있어 태어에게 위해를 끼칠 수 있고 임부에게는 유산산증이 일어나기 쉬우므로 임신할때까지 이 약을 투여하지 않도록 합니다. 임신부 또는 임신할 계획이 있는 환자는 혈당치 이상과 관련된 태아 기형의 위험을 낮출 수 있도록 의사에게 알리고 인슐린 요법으로 전환하여 혈당이 가능한 정상 수준으로 유지되도록 합니다.
- 수유중인 젖에서는 글리메피리드 및 메트포르민은 수유로 분비되는 것으로 보고되었으므로 수유부에는 투여하지 않도록 합니다. 필요한 경우에는 인슐린요법으로 전환하거나 수유를 중단해야 합니다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되지 않았습니다. 어린이의 성숙시기에 나타나는 당뇨병(MODY)에 대해 행해진 연구는 없습니다.

메트포르민 단일제 > 메트포르민의 투여를 시작하기에 앞서 환자가 2형 당뇨병인지에 대해 확인해야 합니다. 1년간 지속된 대조 임상시험에서 메트포르민이 성장 및 성적 성숙에 영향을 주지 않는 것으로 밝혀졌으나 이러한 특정 포인트에 대한 장기 시험결과 는 없습니다. 따라서 소아, 특히 사춘기 이전의 소아를 이 약으로 치료할 때 이러한 파라미터에 미치는 메트포르민의 영향을 주의 깊게 관찰할 것을 권장합니다. 10~12세 연령의 소아 : 소아 및 성장이 청소년에 대한 대조 임상시험에 단 15명의 10~12세 연령의 소아가 참여했습니다. 비록 12세 이하의 소아에서 메트포르민의 유효성 및 안전성은 12세 이상의 소아에서의 유효성 및 안전성과 차이가 없었으나 10~12세 연령의 소아에 메트포르민을 처방할 때 특별한 주의를 기울일 것을 권장합니다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자의 신기능감소와 관련하여 메트포민염산염의 용량은 환자의 신기능에 근거하여 조절되어야 하고, 정기적인 신기능모니터링이 필요합니다. 메트포민염산염 및 글리메피리드는 대부분 신장으로 배설된다고 알려져 있으며, 글리메피리드는 신장을 통해 상당한 양이 배설되므로, 부적절한 신기능을 갖는 환자에서는 심각한 약물 부작용의 위험이 있기 때문에, 정상적인 신기능을 가진 환자에게만 사용하도록 합니다.

10. 임상감사치에의 영향

정기적인 혈액학적 수치에 들어 헤모글로빈/헤마토크리트, 적혈구수(자수)와 신기능(혈장크레아티닌)의 모니터링은 최소 1년을 기준으로 행해져야 합니다. 메트포르민으로 치료 중 대적자구성빈혈이 드물게 관찰되며, 이것의 의심이 있다면 비타민 B₁₂ 결핍가능성을 확인해야 합니다.

11. 과량투여의 처리

이 약은 글리메피리드를 함유하고 있으므로 과량투여시 저혈당이 발생할 수 있습니다. 글리메피리드의 과량 복용이 발견되면 즉시 의자에게 알립니다. 만약 의사의 처치 하에 있지 않다면, 환자는 가능하면 포도당 형태로 즉시 당을 섭취합니다. 의식의 소실 또는 신경학적 결과가 없는 경도의 저혈당 증상은 경구용 포도당을 투여하거나 약물 용량 및/또는 식사 패턴을 조절하여 적극적으로 치료하여야 합니다. 환자에게 위험이 없다는 것을 의사가 확인할 때까지 연일한 모니터링을 계속해야 합니다. 글리메피리드의 위장흡수를 막기위해 초기에는 구도를 유발시키고 다음에는 환자에게 활성탄(흡착제) 및 황산나트륨(하제를 함유하고 있는 청량음료 또는 물을 많이 마시게 합니다. 상당히 많은 양이 흡수된 경우, 위세척을 실시해야 하고 활성탄 및 황산나트륨은 나중에 사용한다. 이 약인 심각한 과다복용과 의식 소실, 심한 신경 이상이 나타나는 경우는 응급상황으로, 즉각적인 조치와 입원이 요구됩니다. 저혈당성 혼수상태가 진단 또는 의심되는 경우, 환자에게 농축 포도당 용액을 정맥 투여예를 들면, 50% 포도당 용액을 급속 정맥 내 주입 또는 20% 포도당 용액 40 ml로 시작, 이후 혈당을 100 mg/dL 가 넘는 수준으로 유지시킬 수 있는 속도로 보다 희석된(10%) 포도당 용액을 점적투사합니다. 성인의 경우 글루카곤을 투여예를 들어 0.5 내지 1mg을 정맥, 피하 또는 근육주사하는 것도 고려될 수 있습니다. 명백한 임상적 회복 후에도 저혈당이 재발할 수 있으므로, 최소한 24 시간 내지 48시간 동안 환자를 면밀하게 모니터링해야 합니다. 특히, 영아 또는 소아가 사고로 글리메피리드를 복용한 경우에는 투여하는 포도당의 용량을 주의하여 조정 투여하고 혈당을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 또한, 이 약은 메트포르민을 함유하고 있으므로 유산산증이 발생할 수 있습니다. 그러나, 메트포민염산염을 85g까지 복용하여도, 저혈당을 유발하지 않습니다. 이 약은 좋은 혈액 동태학적 조건하에서 170ml/분에 이르는 청소율로 투석됩니다. 따라서 이 약의 과량 투여가 의심되는 환자에서 축적된 약물을 제거하기 위한 가장 효율적인 방법은 혈액투석입니다.

12. 발암성, 변이원성, 수태의 무전

글리메피리드

- 랫드에 대해 30개월간 완전한 식이상태에서 최대 5,000 ppm의 용량으로 투여한 시험에서(표면적용을 기준으로 사람에 대한 최대 권장 용량의 약 340배) 발암성의 증거는 없었습니다. 마우스에서 24개월간 글리메피리드를 투여한 결과 용량과 관련 된 만성적인 해당 자극의 결과로 판단되는 양성의 해당산증이 증가하였습니다. 이 시험에서 마우스의 선종형성에 대한 무영향 용량은 완전식이 조건에서 320ppm 또는 46~54mg/kg/day였습니다. 이는 표면적을 기준으로 사람에 대한 최대 권장용량인 1일 1회 8mg의 약 35배에 해당합니다.
- 글리메피리드는 일련의 in vitro와 in vivo 돌연변이 시험에서 돌연변이가 없었습니다.
- 최대 2,500 mg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로 사람에 대한 최대 권장 용량의 >1,700배) 노출된 수컷마우스 수태능에 대한 글리메피리드의 영향은 없었습니다. 글리메피리드는 최대 4,000 mg/kg의 용량으로(표면적을 기준으로 사람에 대한 최대 권장 용량의 약 4,000배) 투여하였을 때 수컷 및 암컷 랫드의 수태능에 영향을 미치지 않았습니다.

메트포르민

- 메트포르민 단독으로 랫드(104주 지속)와 마우스(9주 지속)에 대해 각각 900mg/kg/day와 1500mg/kg/day의 용량으로 장기 간 발암실험이 실시되었습니다. 이러한 용량은 체표면적에 기초한 사람의 일일 최대 허용량의 약 3배입니다. 암수 마우스 모두에서 이 약과 관련된 발암성의 증거는 없었습니다. 유사하게 수컷 랫드에서 이 약에 의한 종양 유발가능성은 없었습니다. 그러나 900mg/kg/day로 투여한 암컷 랫드에서 양성 간질성 지방 용종이 증가하는 것이 관찰되었습니다.
- 복귀돌연변이시험(S. Typhimurium), 유전자 돌연변이시험(아무주 세포), 염색체 이상시험(사람 임파구) 혹은 생체내 소핵시험(마우스 골수세포에서 이 약의 변이원성 가능성에 대한 증거는 없습니다.
- 암수 랫드의 수태능은 600mg/kg/day의 고용량, 또는 체표면적을 기준으로 최대 허용량의 약 2배를 투여했을 때 이 약에 의해 영향을 받지 않았습니다.

13. 기타

- 체중에 대한 영향 : 일반적으로 사용되는 다른 혈당강화제(설포닐우레아계, 차아졸리딘온계 등)와 비교할 때, 메트포르민은 제 2형 당뇨병 환자의 치료 시 체중 증가를 일으키지 않아 유익합니다. 체중을 유지하거나 감소시켜 체중 증가와 관련된 다른 위험 요소를 제한합니다. 장기간 사용 시 보다 안정적인 혈당 조절 및 당뇨병 합병증의 위험을 감소시킵니다. 성인과 소아에 대한 임상시험에서 이 약은 체중증가 없이 혹은 약간의 체중 감소와 함께 혈당 조절을 개선시켰습니다.
- 악물남용과 의존성 : 메트포르민제제는 일차적 혹은 이차적으로 재생성되는 약물이나 탐닉으로 남용을 야기시키는 약물동태학적 성질을 나타내지 않습니다.

14. 적응상의 주의

온전 종이나 기계 사용시에는 주의하도록 알려야 합니다.

15. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

【저장방법】	일폐용기, 실온보관(1~30℃)
【포장단위】	자사포장단위
【사용기한】	제조일로부터 36개월

제조의뢰자 : 대웅바이오주) / 경기도 안성시 공단1로 69
제 조 자 : 구주제약주) / 경기도 화성시 장남면 덕철제기길 5

※ 본 약품들은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 약품들은 공정거래위원회 고시소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

대웅바이오

작성연월일 : 2013. 02. 06
최종개정연월일 : 2015. 09. 22

※ 이 첨부문서 개정 연월일 후 변경된 내용은 대웅바이오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
※ 대웅바이오 홈페이지(www.daewoongbio.co.kr) / 소비자 상담 전화번호(080-789-0787)