



일반의약품

생리통엔 이지엔6이브

연질캡슐



사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.
사용설명서는 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

본 제품은 어린이 안전포장에 설계·생산된 제품입니다.
본 사용 시 ①가위 등으로 절취선을 따라 자르십시오.
②접착이 안된 화살표 부분을 잡고 화살표 방향으로
떼어낸 후 복용하십시오.



【효능·효과】

1. 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(아깨질), 타박상, 골절통, 염좌통(뻘통), 월경통(생리통), 외상통의 진통
2. 오히려 고열을 동반한 증상, 발열시의 해열

【용법·용량】

만 15세 이상 또는 성인 : 1일 1~3회, 1회 1~2캡슐
공복(빈 속)시에 피하여 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

이지엔 6이브는 여성을 위한 생리통 전용 진통제로

1. 액상형으로 빠른 진통효과
2. 무카페인으로 안심하고 복용
3. 파마브롬 성분 함유로 월경 부종 완화



생리통



요통(하리통증)



부종(몸이 붓는 증상)

【원료약품 및 그 분량】 - 1캡슐 중 -

이브프로펜(KP)	200mg
파마브롬(USP)	25mg

【성 성】

무색 내지 연한 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 타원형 연질캡슐입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.
다른 해열진통제, 감기약, 진정제
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 수술 또는 인공관절에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로) 의사와 상의하십시오.
2) 만 3개월 이상 내 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 경우 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직합니다.
3) 본인 안전 또는 형제들이 두드러기, 전축성 피부염, 가려운 천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
5. 간장질환, 신장(콩팥)질환, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
6. 고령자(노인) 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 동맥약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 췌장, 출혈 문제를 가지고 있는 사람
- 10) 구토와 설사로 많은 수분을 소실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적·출혈이 붙어짐, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 부종(부기)
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(나뭇잎) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕부진, 숨쉬기 곤란한 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성피부괴사증후군(리얼증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적·출혈이 붙어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
③ 천식
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜나갑니다.
2) 장기간 계속 복용하지 않습니다.
3) 복용시에는 음주하지 않습니다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관합니다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【포장단위】 자사 포장단위입니다.

【사용기간】 제조일로부터 24개월입니다.

※ 제조자: (주)알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7(주)대웅제약사
 ※ 제조의뢰자: (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 지나거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소자지) 문정 해결기준에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.



제외보통자극약
가죽천하 우수기업



(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2013. 02. 17

※ 이 첨부서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.