

# 메디론 정

(메틸프레드니솔론)

전문의약품  
분류번호 245

## 경구용 부신피질 호르몬제

## Mediron tablets

- 원료약품 및 분량****：**1정 중  
유효성분：**(메틸프레드니솔론(KP)····· 4.0mg**  
첨가제：**(동물유래성분)：**유당수화물(소,우유)  
기타첨가제：**미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스.**
- 성분：**원액의 원형 정제
- 효능·효과：**
  - 내분비 장애：**원발성 및 축발성 부신피질 기능부전증(히드코르티손이나 코르티손이 1차 선택 약물이며, 필요한 경우 광정코르티코이드와 병용해서 합성 코르티코이드를 사용할 수도 있고, 특히 병이키에는 광정코르티코이드를 병용하는 것이 중요하다),** 선천성 부신이상 증식, 암에 수반된 고칼슘혈증, 비하농성 갑상선염
  - 류마티스성 장애  
급성전행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환：**외상 후 골관절염, 골관절염의 활막염, 연조직 류마티스암 관절염을 포함하는 류마티스암 관절염(경우에 따라서는 저용량 유지요법이 필요할 수도 있음), 급성 및 아급성 전역낭염, 상과골, 급성 비키성 간초음, 급성 통풍성 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염**
  - 교원성 질환  
악화 중에 있거나 유지요법이 필요한 다음의 질환：**전신성 홍반성 루푸스(루푸스 신염), 전신성 피부근염(다발성 근염), 급성 류마티스성 심염**
  - 피부 질환：**천포창, 중증 다형성 홍반(스티븐스－존슨증후군), 박탈성 피부염, 수포성 포진양 피부병, 중증 지루성 피부염, 중증 건선, 근상성 육종**
  - 알레르기성 질환  
중증 또는 불능을 초래하는 알레르기성 질환으로서 일반적인 치료로는 반응이 없는 다음의 질환：**기관지 천식, 접촉성 피부염, 아토피성 피부염, 혈청병, 계절성 또는 다년성 알레르기 성 비염, 약물과민반응**
  - 안과 질환  
중증 급만성 알레르기성 또는 염증성으로 눈 및 그 부속기관에 관련되는 다음의 질환：**안대상포진, 홍채염 및 홍채모양체염, 맥락망막염, 후부의 산재성 포도막염 및 맥락막염, 시신경염, 교각신경성 안염, 전방의 염증, 알레르기성 결막염, 알레르기성 각막주위궤양, 각막염**
  - 위장관계 질환  
결장적 위기를 넘기기 위한 다음의 질환：**폐양성 대장염, 크론성 장염**
  - 호흡기계 질환：**중추성 사르코이드증, 폐렴류 증독증, 전각성 또는 폐조직염 폐결핵(적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 다른 방법으로 낫지 않는 폐결핵 증후군, 흡인성 폐염**
  - 혈액 질환：**후천성(자가면역성) 용혈성 빈혈, 성인의 특발성 혈소판 감소성 자반증, 성인의 속발성 혈소판 감소증, 적아구감소증(적혈구 빈혈), 선천성 적혈구 형성 부전성 빈혈**
  - 악성 종양성 질환  
다음 질환의 고식적 관리：**소아의 급성 백혈병, 성인의 백혈병 및 임파종**
  - 부종성 질환：**요독 증상이 없는 특발성 신증후 또는 홍반성 루푸스로 인한 신증후에 있어서 배뇨증가의 유도 및 단백뇨의 완화**
  - 신경계 질환：**다발성 경화증의 급성악화**
  - 기타：**결핵성 수막염(지주막하의 차단장애 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우)**
- 용법·용량**
  - 초기 복용량은 특정 질병의 증상에 따라 메틸프레드니솔론으로서 1일 4mg에서 48mg까지 다양할 수 있다. 일반적으로 심하지 않은 상태에서는 저용량으로 충분하나, 특별한 환자에서는 초기 고용량이 요구될 수도 있다. 초기 용량은 만족스러운 반응이 얻어질 때까지 유지되거나 조정되어야만 한다. 만약 합당한 기간 후에도 만족스러운 임상 결과가 없다면 투여를 중지하고 다른 적절한 치료로 전환하여야 한다. 용량은 치료하는 다양한 질병과 환자의 반응성에 따라 개별적으로 정하는 것이 필요하다. 적정반응이 나타난 후에는 적절한 임상반응을 유지할 수 있는 최소 용량이 될 때까지 알맞은 간격으로 초기용량을 감소시키으로써 적절한 유지용량을 결정해야 한다. 용량에 관해서는 지속적인 모니터링이 요구된다. 질병의 경감이나 악화, 환자 개개인의 약물 반응성, 치료하는 질병의 중증과 직접적인 영향이 없는 스트레스를 가하는 환경에 노출되었을 때 환자에 대한 영향이 있는 경우는 용량조절이 필요할 수 있는 상황에 포함된다. 후자의 경우에 있어서 환자의 상태에 만족스러운 만큼의 기간동안 용량을 증가할 필요가 있을 수 있다.
  - 장기간 치료 후 약물의 중지시 천천히 감소하는 것이 요망된다.
  - 다발성 경화증(Multiple sclerosis)  
다발성 경화증의 급성 악화의 치료는 1주일간 프레드니솔론 200mg를 매일 투여한 후 1달 동안 격일로 프레드니솔론 80mg를 투여하는 것이 효과적이다 (메틸프레드니솔론 4mg은 프레드니솔론 5mg과 같다).
  - ADT(Alternate Day Therapy：격일치료)  
격일치료란 이들 중 하루아침에 1일 용량의 2배를 투여하는 용법이다. 이 용법의 목적은 장기간 약물투여가 요구되는 환자에게 코르티코이드의 효과를 증대시키고, 뇌하수체－부신의 억제, 쿠싱양 상태(Cushingoid state), 메일류 증독증, 전각성 또는 폐조직염 등 부작용을 최소화하는데 있다. 이러한 치료계획의 이론은 다음 2가지 중요한 전제에 기초한다.
    - 코르티코이드의 항염증 효과와 치료 효과가 물리적인 존재와 대사효과보다 더욱 지속되고
    - 일일로 아침에 코르티코이드를 복용하는 것이 코르티코이드를 투여하지 않은 날 거의 정상적인 시상하부－뇌하수체－부신(hypothalamus－pituitary－adrenal：HPA)활성의 재형성을 가져온다. HPA 성리에 대한 간단한 요약은 이러한 이론적 해석의 이해를 도울줄 수 있다. 유리 코르티솔은 주로 시상하부를 통해 작용하므로 유리 코르티솔의 감소는 뇌하수체를 자극하여 부신피질자극호르몬(ACTH)의 생성을 증가시키는 반면, 유리 코르티솔의 상승은 ACTH분비를 억제한다. 정상적으로 HPA계는 24시간동안 활동리듬으로 특정 지워진다. ACTH의 활동성은 오후 10시의 낮은 수준에서 오전 6시에 최고 수준으로 증가한다. ACTH의 증가 수준은 부신피질 활동을 자극하여 오전 2－8시 사이에 혈장 코르티솔을 최고로 증가시키게 한다. 코르티솔의 이런 증가는 ACTH 생성을 감소시키고 따라서 부신피질활동도 저하시킨다. 이것은 하루동안에 혈장 코르티솔이 점차로 증가되어 정상에 치하시켜 한밤중에는 최소수준으로 저하한다. HPA의 24시간 리듬작용이 쿠싱성형(Cushing's disease)에서는 없어지는데, 이 질환은 구상성의 지방분포를 가진 비만, 혈계 병이 드는 얇은 피부, 악하고 근력이 출저고, 고혈압, 잠재성의 당뇨병, 골다공증, 전해질 불균형 등으로 특정 지워지는 부신피질 과기능증의 증상이다. 같은 부신피질기능항진증(hyperadrenocorticism)의 임상증상이 전형적으로 하루에 나누어 투여하는 장기 약물 코르티코이드 요법 동안에 나타날 수 있다. 그것이 나타났다면 방 동안의 상승된 코르티코이드치의 유지로 인한 주간 리듬의 혼란이 코르티코이드의 부작용 발현에 중요한 역할을 할 것 같다.
  - 혈은 기간동안이라도 지속적으로 상승된 혈장 농도로부터 벗어나는 것은 부작용을 방지하는데 있어 도움이 될 수 있다. 전형적인 약물학적 용량의 코르티코이드 요법동안, 부신 피질에 의한 코르티솔의 생성 억제와 함께 ACTH 생성도 억제된다. 정상적인 HPA활성으로 회복시간은 용량과 치료기간에 따라 다양하다. 이 기간동안 환자는 어떠한 스트레스가 있는 환경에도 민감하다. 아침 1회복용이 프레드니솔론(10mg)을 하루 4회에 나누어 매 6시간마다 복용하는 것보다는 상당히 적은 부신 억제를 나타낸다고 할 지라도, 약물학적인 용량을 사용했을 경우 부신활성에 약간의 억제효과가 그 다음날까지 계속된다 고 하는 증거가 있다. 게다가 어떠한 코르티코이드의 단 화 투여는 2일 또는 그 이상까지도 부신 피질의 억제가 보여진다. 메틸프레드니솔론, 히드로코르티손, 프레드니손, 프레드니솔론을 포함하는 다른 코르티코이드는 단기간 적용(1회 투여로 1¼에서 1½일 동안 부신피질억제가 나타남)으로 간주되어야고 따라서 격일치료로 요망된다.

다음의 사항들은 격일 치료를 할 때 염두에 두어야만 한다.

- 코르티코이드의 요법에 있어 기본적인 원칙과 적응증을 적용시켜야 한다. ADT의 장점이 코르티코이드의 무분별한 사용을 부추겨서는 안된다.
- ADT는 장기 약물 코르티코이드 치료를 요망하는 환자에게 기본적으로 계획되어야만 하는 치료기술훈다.
- 코르티코이드 요법의 적응증을 갖는 일 달적인 질병에 있어서는 ADT가 초기에 사용될 수도 있다. 더욱 심각한 질환에서는 질병전행의 초기 조절을 위해 고용량을 하루에 나누어 투여하는 요법이 보통 요구되어 질 것이다. 초기 약물 용량은 만족할 만한 임상반응을 얻을 때까지 계속되어야만 하는데 보통 많은 알레르기 및 교원성 질환에 있어 4일에서 10일 동안이다.
  - 특히 격일 요법의 지속적인 사용을 의도한다면, 가능한 한 짧은 기간동안의 초기 억제 용량기간을 지키는 것이 중요하다. 일단 통제가 이루어지면, 두 가지 경우가 가능하다.
    - ADT로 전환하고 격일에 주어진 코르티코이드의 양을 점진적으로 줄여간다.
    - 질병 전행의 조절에 따라 가능한 한 빨리 최소 효과값으로 코르티코이드의 1일 용량을 감소시키고 난 후 격일 일정으로 변화시킨다. 이론적으로 ①과정에 더욱 바람직하다.
- ADT는 장기 때문에 오랜 기간 동안 매일 코르티코이드를 복용하는 환자에게 이러한 형태의 치료는 바람직하다(예를 들어 류마티스암 관절염), 이러한 환자는 이미 HPA축이 억제되어 있을 수 있으므로 ADT요법을 확립한다는 것이 어려울 수도 있고 항상 성공적인 것은 아니다. 그러나, 변경하려는 구체적인 시도는 추천된다. 만약 어려움이 있다면 단지 매일 용량의 2배를 하는 것보다는 격일에 3배 심지어 4배로 투여하는 것이 바람직하다. 다시 환자가 통제가 되면, 이러한 용량을 점차로 감소하는 시도를 한다.
- 여에서 언급했듯이 어떠한 코르티코이드는 부신기능을 오랫동안 억제하기 때문에 격일 요법으로 추천되지 않는다 (예를 들어 덱사메타손, 베타메타손).
- 부신 피질의 최대 활동은 아침 2시에서 8시까지, 최저는 오후 4시에서 자정까지이다. 최대 활동의 시간대에 투여되었을 때(오전), 외인성 코르티코이드는 부신피질 활동을 가장 적게 억제한다.
- ADT사용에 있어서, 모든 치료환경에서처럼, 각 환자에게 있어 개인화 되고 적절한 치료를 하는 것이 중요하다. 모든 환자에게 있어 증상의 완전한 통제는 불가능하다. ADT의 장점에 대한 설명은 환자에게 코르티코이드제를 투여하지 않은 날의 후반기에 나타날 수 있는 불만정한 증상을 이해하고 참아내는 데 도움을 줄 것이다. 만약 필요하다면 이 기간 동안 다른 증상 치료를 부가시키거나 증가시킬 수 있다.
- 질병전행중 급성악화가 나타난다면 조절을 위하여 코르티코이드 용량을 하루에 나누어 완전히 억제하는 용량으로 돌아가는 것이 필요할 수도 있다. 일단 조절이 된 후에는 성립된 격일 요법으로 재시도할 수 있다.
- 많은 코르티코이드 요법의 부작용들이 ADT로서 최소화될 수 있다고 할지라도, 모든 치료환경에서 그러하듯이 의사는 코르티코이드 치료가 생각되는 각 환자에 있어 치료 이익성과 위험성의 비율을 신중히 고려해야만 한다.

### ■ 사용상 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.**
  - 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
  - 유리한 항균제가 없는 감염증, 전신 진균 감염증 환자(면역기능 억제작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있다)
  - 단순포진, 대상포진, 수두 환자
  - 생백신 또는 약독 생백신을 투여중인 환자
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당－갈락토오스 흡수장애(glucose－galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**
  - 투여하지 않는 것을 원칙으로 하지만 다음 환자에는 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여한다.
    - 녹내장 환자(안압이 상승하여 녹내장이 악화될 수 있다)
    - 결핵성 질환, 단순포진성 각막염 환자(면역 억제작용에 의해 증상을 악화시킬 수 있다)
    - 후낭하 백내장 환자(수정체선염의 영향으로 증상이 악화될 수 있다)
    - 전해질이상 환자, 고혈압 환자(전해질 대사작용에 의해 증상이 악화될 수 있다)
    - 혈전증 환자(혈액응고촉진작용에 의해 혈전증이 악화될 수 있다)
    - 최근 장문합술을 받은 환자(심장지 치유 지연이 일어날 수 있다)
    - 급성심근경색을 일으킨 적이 있는 환자(심파열을 일으켰다는 보고가 있다)
    - 게실염 환자
    - 소화성 궤양 환자(소화관 보호작용을 약화시키고, 조직의 수축을 방해하므로 증상이 악화될 수 있다)
    - 정신병 환자(대뇌전연계의 신경전달물질에 영향을 주어 증상이 악화될 수 있다)
    - 중증 골다공증 환자(골형성 억제작용 등에 의해 골다공증이 악화될 수 있다)
  - 감염증이 있는 환자(면역기능 억제작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있다)

- 12) 골다공증, 고혈압, 울혈성 심부전, 심각한 강직이상, 당뇨병, 결핵, 녹내장, 간장애, 신부전, 간질, 소화성 궤양의 병력이 있는 환자(병이 악화될 수 있다)

### 3. 이상반응

다음 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 적절한 조치를 한다.

- 체액·전해질：**부종, 나트륨저류, 칼륨손실, 체액저류, 저칼륨성 말갈리혈증, 감수성 환자에 있어서 울혈성 심부전, 고혈압 등이 나타날 수 있다.**
- 근·골격계：**근무력증, 대퇴골 및 상원골 말단의 무균성 파사, 스테로이드성 근병증, 근육질질의 손실, 장골의 병리적 골절, 골다공증, 척추압박골절, 관절통, 건파열(특히 아킬레스건) 등이 나타날 수 있다.**
- 소화기계：**ALT, AST, ALP 증가, 구역, 구갈, 구토, 위통, 식욕부진, 식욕항진, 천공 및 출혈의 가능성이 있는 소화성 궤양, 복부팽만감, 궤양염, 궤양성 식도염, 설사 등이 나타날 수 있다.**
- 피부：**장상지유지염, 안면 홍반, 알과 연관된 피부, 발한 이상, 점상출혈 및 반상출혈, 피부부반응의 억제현상, 자반, 여드름, 다모, 탈모, 색소 침착 등이 나타날 수 있다.**
- 정신·신경계：**치료 후 일어나는 유두부종(뇌농양)을 수반한 두개내압 상승, 경련, 어지러움, 두통, 불면, 다행감, 우울증 등이 나타날 수 있다.**
- 내분비계：**쿠싱증후군(월경안), 월경 이상, 소아의 성장억제, 잠재성 당뇨병 증상의 발현, 속발성 부신기능부전과 뇌하수체 무반응(특히 외상, 수술, 질병시 등 스트레스시), 내당력 감소, 당뇨병 환자에 있어서 인슐린 또는 경구용 혈당강화제의 요구량 증가, 부신피질자극호르몬 분비 억제 등이 나타날 수 있다.**
- 눈：**연용에 의해 안압항진, 녹내장, 후방하 백내장, 공막이나 바이러스에 의한 눈의 2차 감염을 초래할 수 있으므로 정기적으로 검사를 하는 것이 바람직하다. 중심성 장맥성 맥락망막증 등에 의해 망막장애, 안구돌출 등이 나타날 수 있다.**
- 지질·단백질 대사：**단백이화작용으로 인한 용혈질소병형이 나타날 수 있다.**
- 면역계：**면역계 장애, 정맥내 사용시 알레르기 반응, 드물게 속까지 일어날 수 있다.**
- 기타：**코르티코이드 요법과 관련하여 경구와 비경구 투여시 다음과 같은 부작용이 보고된바 있다**  
－ 두드러기, 기타 다른 알레르기성 반응, 아나필락시 반응, 과민성 반응

### 4. 일반적주의

- 장기투여시 속발성 부신피질부전이 나타날 수 있으며, 투여 중지 후 수개월까지 계속될 수 있다. 장기 투여 후 코르티코이드를 갑자기 중지하면 급성부신부전, 가름 발열, 두통, 식욕부진, 무력감, 근육통, 관절통, 속출증 등이 나타날 수 있으므로 점진적으로 감량하는 등 특히 주의하며, 급단증상이 나타난 경우에는 즉시 재투여 또는 중단한다. 장기 투여 중 외상, 수술, 감염 등의 스트레스 발생시 일시적으로 투여량을 증가해야 하며, 장기 투여 후 투여 중지상태인 경우에는 일시적으로 재투여해야 한다. 광정코르티코이드 분비가 손상을 받을 수 있으므로 염분 또는 광정코르티코이드를 병용하는 것이 바람직하다.
- 장기 치료시 위험도를 고려한 후 치료를 시작해야 하며, 부작용은 투여량, 투여기간과 상관성을 나타내므로 최소 유효량을 되도록 단기간 투여하며 1일 1회 아침에 투여하거나 격일 투여가 권장된다.
- 면역억제제를 투여중인 환자(소아)는 건강한 사람(소아)보다 감염되기 쉽다. 예를 들어 수두나 홍역은 면역억제제인 코르티코이드를 투여한 환자에서 더 심각하거나 심지어 치명적인 결과를 일으킬 수 있다. 이러한 질환을 앓아 본적이 없는 성인 및 소아의 경우 이러한 것에 노출되지 않도록 특히 주의한다. 만일 수두에 노출되면 3일－10일 이내 수두대상포진 면역글로불린(VZIG), 홍역에 노출되면 면역글로불린(IG) 같은 예방처치가 필요하다. 수두가 발생되면 항바이러스 약물 사용이 고려된다.
- 코르티코이드 요법을 받는 환자는 생백신을 투여 받으면 안되며, 신경학적 합병증의 가능성과 함께반응의 결핍으로 인하여 특히 고용량으로 코르티코이드를 투여중인 환자는 기타의 예방 접종도 하지 않아야 한다
- 코르티코이드를 투여하면 감염증의 증상을 때때로 불현성화시킬 수 있으며 사용 중 또 다른 감염을 발생할 수 있다. 코르티코이드 투여 중에는 감염을 국소화시키는 능력과 저항력이 저하될 수 있다.
- 활동성 결핵환자에 이 약의 투여는 전격성, 파동성 결핵에 한정되어 적절한 항결핵요법제와 병용투여한다.
- 장복성 결핵 환자 또는 투베르쿨린 반응 양성 환자에게 코르티코이드를 투여할 경우 결핵이 재활동화될 수 있으므로 세밀한 관찰이 필요하며 장기 연용할 경우에는 예방적 화학요법을 받아야 한다.
- 임상시험에서 코르티코이드가 다발성 경화증의 급성악화를 신속하게 경감시키는데 유효한 것으로 나타났으나 근본적인 치료를 하는 것으로 볼 수 없다.
- 히드코르티손 또는 코르티손의 평균용량 또는 그 이상을 사용할 경우 월안상증, 영과 수분의 저류, 칼륨배설의 증가를 일으킬 수 있으나 과잉 투여시 이외에는 항성유도제로 인한 이런 작용이 나타날 염려가 없다. 음식을 섭취시 염제한과 칼륨보충이 필요할 수 있다. 모든 코르티코이드는 칼륨배설을 증가시킨다.
- 특히, 이 약 투여중에 수두 또는 홍역에 감염되면, 치명적인 경과에 이를 수 있으므로, 다음 주의가 필요하다.
  - 이 약 투여중에 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종의 유무를 확인한다.
  - 수두 또는 홍역의 병력이 없는 환자에 대해서는 수두 또는 홍역에의 감염을 최대한 방지하여 충분한 배려와 관찰을 한다. 감염이 의심스러운 경우와 감염된 경우에는 즉시 전질을 받아 지도하고, 적절한 처치를 한다.
  - 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종을 받은 적이 있는 환자에서도 이 약 투여중에 수두 또는 홍역이 나타날 가능성이 있으므로 유의한다.

### 5. 상호작용

- 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 약물(아스테미졸, 베르리달, 에리스로미아신 IV, 할로판리돈, 펜타미딘, 스피로플록사신, 빈카민, 설도프리드)과 병용투여하지 않는다.
- 다형성 심실 빈맥을 일으킬 수 있는 항부정맥제(아이미다론, 디소피라미드, 퀴니딘, 소탈롤)와의 병용에 의해 서맥, QT 간격 연장, 저칼륨혈증 등이 나타나 부정맥을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여하고 심실 빈맥이 나타나면 항부정맥제 투여를 중지한다.
- 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리튬, 카르바마제핀, 프리미드, 아미노글루테미디드, 리파부틴과 병용투여에 의해 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 병용투여시 용량에 주의한다.
- 바스테로이드성 소염제와 병용투여시 위장관 궤양의 위험을 증가시킬 수 있으며, 아스피린과 병용투여시 아스피린의 신형소율을 증가시켜 살리실산염의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약을 중단했을 때 살리실산염의 독성을 증가시킬 수 있으므로 용량에 주의한다. 특히 저프로토피빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린을 병용투여시 주의한다.
- 항응고제, 혈당강화제의 경우 코르티코이드와의 병용투여에 의해 그 작용이 악화될 수 있으므로 용량조절이 필요하다.
- 이노신(칼륨보존성 이노제는 제외), 알로페리산 B, 카르바마제론, 안화제와의 병용에 의해 저칼륨혈증이 나타날 수 있으므로, 자주 혈중 칼륨농도를 검사하고 병용투여시 용량에 주의한다.
- 디기탈리드 배당체와 병용투여시 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성이 증가할 수 있으므로 혈중 칼륨농도를 검사하고 경우에 따라서는 선전도 검사를 실시한다.
- 이소니아지드와 병용투여시 이소니아지드의 혈중농도가 감소하므로 용량조절이 필요하다.
- 혈장내 당질화코르티코이드의 위장관 흡수를 방해하므로 투여간격을 2시간 이상으로 한다.
- 제산제의 고용량과 병용투여시 혈안정효소를 감소시킬 수 있다(나트륨 증가로 수분정체 위험이 있다).
- 일파인더페론과 병용투여시 인터페론의 활성을 억제할 수 있다.
- 사이클로스포린과 병용투여시 사이클로스포린의 혈중농도를 상승시켜 경련이 발생했다는 보고가 있으므로 병용투여시 용량에 주의한다.
- 케토코나졸, 에리스로미아신, 트플레만도미아신, 에스트로겐은 이 약의 작용을 증가시킬 수 있으므로 병용투여시 용량조절에 주의한다.
- 비탈복구성 에이전제(브루파코프로니올 등)와 병용에 의해 근이완 작용이 감소 또는 증가될 수 있으므로 병용투여시 용량에 주의한다.
- ACE억제제와의 병용에 의해 혈액성 변화 발생위험이 증가할 수 있다.
- 클로로퀸, 히드록시클로로퀸과의 병용에 의해 근병증, 심근증 발생위험이 증가할 수 있다.
- 소마트로핀과의 병용에 의해 소마트로핀의 효과를 감소시킬 수 있다.

### 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 동물실험에서 기형발생 작용이 보고되어 있으며 태아의 성장지체, 연천이의 위험 등의 증가, 태아의 뇌성장 및 발달에도 영향을 끼칠 수 있으며 임신 중에 코르티코이드를 투여한 모체에서 태어난 신생아의 경우 부신부전증을 일으킬 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

- 2) 코르티코이드는 모유유으로 이행될 수 있으므로 이 약 투여 중에는 수유를 중단한다.

### 7. 소아에 대한 투여

- 소아 및 청소년기에서 용량 관련 성장지체가 비가역적으로 나타날 수 있으므로 소아에 코르티코이드를 투여할 경우에는 최소용량을 투여해야 하며 발육장애에 관해 주의깊게 관찰한다.
- 장기 투여한 경우 두개내압 항진증상이 나타날 수 있다.

### 8. 고령자에 대한 투여

고령자에 장기 투여한 경우, 감염증의 유발, 당뇨병, 골다공증, 고혈압, 후낭하 백내장, 녹내장 등의 부작용이 나타나기 쉬우므로 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.

### 9. 기타

- β2-효능제와 병용에 의해 저칼륨혈증이 나타날 수 있다.
- 외국에서 사군 백신과 불활성화 백신의 효과가 감소되었다는 보고가 있다.
- 코르티코이드의 투여로 피부시험반응이 억제될 수 있으므로 이 약 투여 중 피부시험을 할 때는 주의한다.
- 외국에서 가보 증양이 나타난다는 보고가 있다.
- 코르티코이드를 투여 받은 환자에게 카포시육종이 보고된 바 있다.

### ■ 저장방법

### ■ 사용기간

### ■ 포장단위

### ■ 제조의뢰자

### ■ 제조 및 판매자

이 첨부서류의 작성일(2017년 08월 08일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 **화일약품(주)**(02-564-2722) 또는 (주)동구바이오제약(080-611-8690, 수신지부담)으로 문의하시기 바랍니다

[PS71708.07 / SW-17-08]

제조의약품

hwail 화일약품 (주)

제조 및 판매자

동구바이오제약

※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.  
※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.  
※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.  
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 즉시 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.