

아카펜에스정

일반 의약품
분류번호:114

ACAFEN-S Tab.

【원료약품의 분량】1정 중

아세트아미노펜 (KP)	200mg
에페드린염산염 (KP)	25mg
카페인무수물 (KP)	25mg

【성 성】백색의 원형정제

【효능·효과】

감기의 증상상 (인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 - MAO 억제제 (항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 (젖당분해효소) 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 (비염용 경구제, 알레르기약, 알레르기약)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이 (구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - 속 (아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종, 기슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 피부점막만 증후군 (스티븐스-존슨증후군), 중독성 표피괴사증후군 (리엘 증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - 천식
 - 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달 (피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 - 간질성 폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 장기간 계속 복용하지 말 것
 - 복용시에는 음주하지 말 것
 - 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 오용을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】300정

【저장방법】밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2013. 02. 26

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변색 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원 등을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발 [Tel:02-580-5900(대)]로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되어 있으며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품동 정보]를 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

신원제약 (주) 뉴진팜
신원제약 (주) 뉴진팜
신원제약 (주) 뉴진팜