

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽은신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[일반의약품]

[분류번호 : 395]

염증 및 부종(부기)완화
브로모타제 정
파인애플 추출 성분(브로멜라인)

[유효성분] 1정 중

브로멜라인(KP).....40mg
결정트립신(USP).....1mg
동물유래성분 : 결정트립신(돼지, 췌장)

[효능효과]

다음 증상 및 질환의 염증성 부종의 완화: 수술 및 외상후, 유즙울체

[용법용량]

성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.
체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

[사용상의주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈액응고이상 환자
- 2) 심한 간장애 또는 신장애 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.

- 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 과민반응 : 발진, 발적 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 실온(1~30℃)보관, 기밀용기

[포장단위] 10정/PTP/케이스

[사용기한] 케이스 측면 표시일까지

[첨가제]

동물유래성분: 무수유당(소,유(乳))
타르색소: 청색1호알루미늄레이크, 황색203호(알루미늄레이크)
기타첨가제: 크로스포비돈, 폴리에틸렌글리콜4000, 셀룰, 산화티탄, 실리콘디옥사이드, 스테아르산마그네슘, 히프록셀로오스프탈레이트 200731, 미결정셀룰로오스

[소비자 상담 창구]

전화번호 : (054) 552-5381~2
홈페이지 : <http://www.alphapharm.co.kr>

설명서 작성년월일 : 2023년 7월 7일

제조사:



ALPHA PHARM CO., LTD.
경상북도 문경시 산양면 산양공단2길 20