

피로회복·체력증강·소모성 질환 빅톤에프연질캡슐

■ 성분·함량 (1캡슐 중)

아스코르브산(KP)	100mg
플신(KP)	0.5mg
티아민질산염(KP)	20mg
리보플라빈(KP)	10mg
피라독신염산염(KP)	45mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색 1호	

■ 성 상 : 노란색의 내용물을 함유하는 암적색(검붉은색)의장방형 연질캡슐제

■ 용법·용량 : 성인-1회1캡슐, 1일 1회 복용

■ 효능·효과

다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급

■ 육체피로, 임신·수유기, 병중(병을 앓는동안)·병후(회복후)의 체력 저하시

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 사람에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만3개월 미만의 젖먹이 3) 대두유에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오 : 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고있는 환자 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 붉은변

2) 피라독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

3) 장기간 고용량을 투여할경우 내성이 생길 수 있습니다.

4) 우발적으로 과량 복용한 경우 5) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.

2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분 하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 뭘 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 별도표기

■ 포장단위 : 자사포장단위

※구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 소손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 공정거래 위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본착성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의의 (02)2211-6700/www.sinilpharm.com

제조사 : (주)서흥캡셀

충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자 :  신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272

공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

