(전문의약품)

암브론 30mg 정

(암브록솔염산염)

일반의약품 분류번호 222

[원료약품 및 그 분량] 1정 중
암브록솔염산염(BP)……30 mg
[효능 및 효과] 1. 주 효능 효과
점액과잉분비에 의한 급·만성 호흡기 질환 : 급·만성기관지염, 천식성기관지염, 폐기종염, 건성폐염
[용법 및 용량] 성인 : 현브록솔염산염으로서 1회 30 mg 1일 3회 경구투여한다. 제습치료시 1회 30 mg 1일 2회 투여한다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
[성 상] 흰색의 원형 정제
[저 장 법] 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관
[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 말 것.
1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 환자 2) 중증 신장애 환자 3) 중증 간장애 환자 4) 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍, 글루코오스-갈락토오스 흡수부전증의 유전적 소인을 가진 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 신장애 환자 2) 소화성 궤양 환자 3) 임부 : 이 약은 태반관문을 통과한다. 비임상시험 뿐만 아니라 임신 28주후의 임상 경험에서도 임신중에 악영향의 증거는 보이지 않았으나 이 약은 임신중에 투여가 권장되지 않는다. (설치, 임신 초기 3개월 이내에 투여하지 않는다.) 4) 수유부 : 이 약은 모유로 이행하므로 수유부에게 투여하는 것을 권장하지 않는다. 5) 고령자 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약과 같은 점액용해제 복용과 관련하여 스티븐스-존슨 증후군, 독성 표피 괴사용해(TEN: toxic epidermal necrolysis) 같은 심각한 피부 손상이 매우 드물게 보고되었다. 이 와 복용 중 새로운 피부증상 손상이 나타나면 즉시 복용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다. 또한 스티븐스-존슨 증후군 또는 독성표피괴사용해(TEN)의 초기증상이 열, 가려움증, 비염, 기침 및 인후염과 유사할 수 있으므로 주의해야 한다.

KGMP적격업체

조아제약주

2) 소화기계 : 때때로 소화불량, 구역, 구토, 가슴쓰림, 구강건조를 포함하는 경미한 상부 위장관계 이상반응, 드물게 위통, 복부팽만감, 위 - 복부통, 설사, 변비, 식욕부진 등이 나타날 수 있다. 3) 과민증 : 드물게 피부 발진과 같은 알레르기 반응과 혈관외 급성 아나필락시스양반응(아나필락시스 속 포함)이 보고되었으며, 두드러기, 두드러기양반응, 혈관부종(혈관부기), 가려움, 안면종창(얼굴부기), 호흡곤란, 호흡을 수반한 체중상승 등이 나타날 수 있다. 4) 호흡기계 : 폐혈구증가를 수반하는 호중성 비염이 나타날 수 있다. 5) 신경계 : 피에는 현기감각이상, 미각변화가 보고되었으며, 드물게 두통, 어지러움증, 편측마비감 등이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 에리트로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 암피실린 등와 함께 복용 시 기관지폐렴비율과 객담(가래)에서 항생물질의 농도를 증가시킨다. 2) 사람에서 과환루여와 관련된 뚜이적인 증상은 보고된 바 없다. 우발적인 과환루여나 루여 오류로 얻어 보고된 증상들은 이 약물 1회 상용량으로 투여하였을 때 보고된 이상반응과 유사하였다. 과환루여에 의한 증상 치료는 대증요법을 실시한다.

5. 저장상의 주의사항
1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것 같아서 보관한다. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

[포 장 단 위] 30정, 500정
[제 조 자] 조아제약㈜(http://www.choa.co.kr)
본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
[수신자부담고객상담실] 080-888-8585

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다. ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 참고 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 의약품 관련 어플리케이션 및 기타 최신 의약품정보는 아지트정보(http://agit.go.kr) → 전문의약품 → 의약품 품절 및 회수 참조하십시오. ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 신고하십시오.

개정작성일 : 2013. 02. 07 (Rev.0)