

활성비타민 벤포티아민 함유 고품량 신경비타민

뉴트리-비 프리미엄 정

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【일반의약품】



■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

■ 유효성분 :

피리독신염산염(KP).....	50mg
d-비오틴(USP).....	0.25mg
시아노코발라민(KP).....	0.05mg
토코페롤아세테이트2배산(BP).....	20mg
(비타민E로서 10IU)	
폴산(KP).....	0.2mg
벤포티아민(KP).....	50mg
(티아민염산염으로서36.15mg)	
니코틴산아미드(KP).....	50mg
판토텐산칼슘(KP).....	50mg
산화아연(KP).....	18.7mg
(아연으로서15mg)	
아스코르브산과립(별규).....	51.55mg
(아스코르브산으로서50mg)	
우르소데옥시콜산(KP).....	15mg
이노시톨(KP).....	50mg
리보플라빈(KP).....	50mg
콜린타르타르산염(DAB).....	50mg
셀레늄함유건조효모(KP).....	46.3mg
(셀레늄으로서25μg)	

- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 갈색(85F465001), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바납, 콜로이드성산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

■ 성상 : 갈색의 타원형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

- 노년기

이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

1. 비타민B₁(벤포티아민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로

2. 비타민B₂(리보플라빈), 비타민B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

아연의 보급

■ 용법 · 용량

만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는) 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는) 대장염 등의 위장질환 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장(콩팥)장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 피부염, 땀 · 호흡기 악취, 탈모, 조급증, 구토, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종(폐부기)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 10) 우발적으로 과량복용 한 경우

- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기한 : 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ 포장단위 : 60정/병

■ 소비자상담 : 080-203-6000(수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱 제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품검색란을 참조하십시오.

제조의뢰자 · 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : 알리코제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21

최초 작성연월일 : 20130311

최종 개정연월일 : 20180403

❖ 코오롱제약