

비타민D와 칼슘복합제

고칼디정

분류번호:321

일반의약품

GocalD Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

탄산칼슘(USP).....	1250mg
(칼슘으로서 500mg)	
농축콜레칼시페롤과립(EP).....	10mg
(콜레칼시페롤로서 1,000IU)	
· 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 4호	

【성상】 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
- 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
- 칼슘 결핍 및 기타 칼슘 보급

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 과칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아
 - 신결석 환자
 - 중증의 신부전 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
 - 임부, 수유부
 - 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
- 대량(많은 양)투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선(나아짐)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 항알도스테론, 트리암테렌과 병용(함께 복용) 투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용) 투여하지 않는다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 오남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정, 90정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 '의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2013년 05월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 마케팅(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(ezdrug.kda.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

첨부문서 개정일 : 2013년 05월 20일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남부순환로 2038
공장:강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495
http://www.dhpharm.co.kr