

심혈관질환예방약(뇌졸중, 심근경색 등)

KGMP

29

아스필장용정

(아스피린 100mg)

※ 사용 전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오

【원료약품 및 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 아스피린(BP)

100mg

■참가처: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스102, 스테아르산, 아크릴아이드 화이트 93C18509, 오파드라이화이트 OY-C-7000A, 전호화전
무 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 얇은 장유성 필름과트렌지

【点评·点拨】

- ④ 다음 질문에 대한 정답을 고르시오
- 심근경색
 - 뇌경색
 - 불안정형 협심증
- ⑤ 관상동맥 우회술(CABG) 또는 경피경관 관상동맥 성형술(PTCA) 후 혈전 생성 억제
- ⑥ 고혈압 환자에서 혈당 상승을 유발하는 약물과 고혈당, 고콜레스테롤혈증, 비만, 당뇨병 복합적 위험인자를 가진 환자에서 심혈관계 위험성 감소

【음성·시각】

성인 1일 1회 1정

의사의 처방 없이 고용량을 복용하지 않는다

아스피린을 함유하는 제제는 위장관 출혈의 이상반응으로 인하여 항응고에 투여하지 않는 것이 일반적이다. 이 제제는 정용정¹이므로 중독 현상도 항응고 작용에 포함할 수 있다.

출혈의 위험이 있으므로 수술 치료술 요법을 하는 경우에는 담당의사에게 아스피린 제제를 복용하고 있음을 알리고 당담을 실시하여야 한다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 **혈당조절제**를 복용하여 별 경우 만드신 의사 또는 약사와 상의하여야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장장애가 유발될 수 있다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
- 1) 미 약 또는 다른 **살리실산**제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) **간** 소화장애 환자
- 3) **아스파린산**비테스테로이드 소염진통제 등에 의한 **천식**발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) **혈우병** 환자
- 5) 심한 **간장** 장애
- 6) 심한 **신장** 장애 환자
- 7) 심한 **심기능**부전 환자
- 8) **술**을 과량에 있는 환자
- 9) **임**유지 중인 **페도트**세이트 5밀리그램(5mg) 이상의 용량을 복용 투여하는 환자
- 10) **간**신 37에 해당하는 임부 7 임부 및 수유부(모유 수유를 중단하여 함 함)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
- 1) **신**장 장애 또는 **심**장판 결핵 기능 이상 환자(신장 및 **심**장, **중**심 **심**부전, **제**적 **간**소, 큰 **수**소, **확**장증 또는 **중**요 **혈**관 사고 등)
- 2) **간**장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 3) **신**기능이상 환자
- 4) **혈**액 이상 또는 그 병력이 있는 환자
- 5) **간**기능이상 환자
- 6) **수**술전 또는 **수**술 후 환자
- 7) **간**내외과 환자
- 8) **진**통제, 소염제, 항응고제/피해에 대한 과민증 및 다른 **약**제로서 **진**통제 병력이 있는 환자
- 9) **고**령자
- 10) **임**용 **고**령자를 **경**험투여하는 환자 및 **신**소 **신**소
- 11) **모**노클로니알성 **혈**소수신(GCPI) **결**핵 환자. 이 약이 **중**독 및 **중**독성 **신**을 유발할 수 있다. **용**량의 **위**험을 **중**시시킬 수 있는 **요**인으로 **중**독을 **고**려할 것

4. 이상반응

기재된 이상약물반응은 아스피린 제제의 단기, 장기 경구 투여를 포함한 자발적 시판 후 보고에 근거하였다.

11. 육·육 및 내·육의 사망 증상 보고 관련 전신조영 혈관부종, 두드러기 등이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하여 이상이 확인될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 할 것. 이 것은 전신발전을 유발할 수 있다.

2. 과민증: 흥분, 간지러움, 코막힘, 심장-호흡기 장애, 파열로 발전, 부종, 두드러기, 비염염 증상, 결막염 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3) 피부: 드물게 리얼중후군(중독성표피괴사증), 스티븐스-존슨중후군(피부점막안중후군), 박탈성 피부염이 나타날 수 있으므로 충분한 관찰하고 이상이 있을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.

4. 혈액 : 드물게 제삼혈관성인혈, 빈혈, 백혈구감소, 혈소판감소, 혈소판기능 저해출혈시간의 지연 등이 나타날 수 있으므로 총괄해 관찰하고 이상이 있을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다.

5) 소화기계 : 식욕부진, 가슴쓰림, 위통, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있고 장기간에서 위장장애에 대한 이상반응에 의해 위장장애를 호소

이 정신신경: 귀에서 소리가 남, 귀 먹음, 어지러움, 두통, 현훈 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 영

가) 간장 : 드물게 간장애가 나타날 수 있다. 매우 드물게 간 트랜스아미나제 상승에 따른 일시적인 간손상이 보고되었다.

외 기타: 보호를 대상한 실종 등이 나타날 경우에는 협동능도가 현저하게 상실을 수 있으므로 응급을 줄이거나 투여를 중지한다.

1) 성립시기, 제재와 죄에 중후궁조의 인과관계는 명확하지 않으나 관련성이 있다는 면학조사보고가 있으므로 1세 이하의 수괴 또는

(레이중환: 소아에 있어 매우 드물게 수두 인플루엔자 등의 바이러스성 질환에 뒤이어 심한 구토, 의식장애, 경련, 근신(痙攣) 등)가

이외의 장

의 증상이 단기간에 발현하는 증세로 사망율이 높음)