

카메드정

(카페인무수물/디멘히드리네이트)

KMD 2015.04.06-01

카메드정

KAMED Tab.

【원료약품의 분량】 1정 중

카페인무수물(KP)	30mg
디멘히드리네이트(KP)	25mg
첨가제(타르색소) : 황색 203호, 적색 40호	
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)	

【성 상】

분홍색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

멀미에 의한 어지러움·구토·두통의 예방 및 완화

【용법·용량】

멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간 전에 연령에 따라 다음과 같이 복용한다. 또 증상 발현시에 추가 복용할 경우에는 1회 복용량을 추가 복용하되 4시간 이상 간격을 두고 복용하고 1일 복용횟수는 3회를 한도로 한다.

만 15세이상 : 1정
만 11세이상 - 만 15세미만 : 2/3정
만 7세이상 - 만 11세미만 : 1/2정

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 수유부
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
다른 진토제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제 등
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람

일반의약품
분류번호 : 235

- 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약을 복용함으로써 발진 충혈되어 붉어짐, 가려움등이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여할 것
 - 이 약을 복용함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것
 - 이 약을 복용하는 동안 알코올 음료를 마시지 말 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

- ❖ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ❖ 이 설명서의 개정일자 2015년 04월 06일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com)또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ❖ 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
KMD 2015.04.06-01