

비오플® 250

(사카로마이세스보울라르디균)
효도균 정장제

조제용일반의약품 분류번호 237

- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

48캡슐 (6캡슐/PTP)X8

본 제품은 외부의 충격에 의해 파손 될 수 있고 보관중 굳는 현상이 나타날 수 있으므로 충격 및 습기에 주의하여 취급하여 주십시오.

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- 본 제품의 품질관련 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.

- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 약품은 약국개설자 및 약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
- 본사는 제조를 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다.

- **최신의 정보 확인방법** : 이 첨부문서 최종개정년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnil.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 약품용 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>) 참조하시기 바랍니다.

최종개정년월일 2015.02.24
(00뒤)

수입판매자
건일제약(주)
충남 천안시 서북구 직산읍 가리막길 33

제조사
BIOCODEX
1, Avenue Blaise Pascal 60000 BEAULVAIS, FRANCE

비오플은 프랑스 BIOCODEX사에서 개발되어 전 세계적으로 각종 장질환에 사용되고 있는 제품으로서 Saccharomyces boulardii균을 주성분으로 하는 제제입니다. 건강한 인체의 소화기계에는 수많은 미생물들이 균형을 이루며 고유의 작용, 즉 면역작용(방어작용), 대사작용 등을 나타내지만 식중독, 항생제 및 약물치료, 외과적수술 등에 의해 장내 세균총의 균형이 깨지면 설사, 복부팽만감, 산통 등의 여러가지 증상이 나타납니다.

비오플은 장내 병원균의 증식을 억제하고 병원균들의 독소를 감소시키며 면역물질 및 탄수화물 분해효소를 분비함으로써 불균형상태의 장내 세균총을 정상상태로 회복시켜 각종 장질환에 우수한 효과를 나타냅니다.

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중
사카로마이세스보울라르디균 (별규)..... 282.5mg (생균수로서 5×10⁹)

성상

미황색의 분말이 든 상·하 백색의 경질캡슐제

작용 및 특징

- 비오플은 사카로마이세스 보울라르디균을 살아 있는 상태로 장기간 보존하기 위해 사카로마이세스 보울라르디균을 동결건조시킨 제제입니다. 이 효도균은 산소의 유무에 관계없이 생존하므로 산소가 없는 장에서 잘 부화되어 고유의 작용을 나타냅니다.
- 비오플은 유산균제와는 달리 위액 및 장액에 안정하여 살아있는 상태로 결장에 도달합니다.
- 비오플은 소화기계에서 여러가지 병원성 미생물의 증식을 억제하고, 세균이 분비하는 독소를 중화시키는 등 질병의 원인 물질을 제거합니다.
- 비오플은 면역계에 작용하는 물질(분비성 Ig A 등)의 분비를 촉진시켜 인체내 면역계 방어작용을 증가시킵니다.
- 비오플은 아미노산, 비타민 B군, 여러 종류의 효소(특히 sucrase)를 풍부하게 함유하고 있는 사카로마이세스 보울라르디균 제제로서 장내 세균총에 영양분을 공급하고 흡수되지 않는 영양소의 분해 및 흡수를 촉진시킵니다.
- 비오플은 항생제에 내성을 나타내므로 항생제 투여가 필요한 질환에 있어서 항생제와 병용 투여시에도 살아남아 고유 기능을 발휘합니다.
- 비오플은 이상반응이 없어 안전하며 맛이 좋아 성인은 물론 소·유아에게 특히 좋습니다.

효능·효과

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

장내균총 이상(항생물질, 화학요법제 투여 등)에 의한 여러 증상의 개선 : 장장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감, 장내이상발효

용법·용량

- 성인 및 12세 이상의 어린이 : 1회 1~2캡슐씩 1일 2회 경구투여
- 3세~12세 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 경구투여
- 3세 미만 : 1회 1캡슐씩 1일 2회 경구투여

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 중심정맥 카테터를 사용 중인 환자[5, 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항* 항을 참조]
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.
- 소아에 대한 투여
 - 3개월 미만의 영아에게 투여할 경우에는 의사 또는 의사와 상의하십시오.
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

카테터의 균제형성(colonization)을 예방하기 위해 중심정맥 카테터를 사용중인 환자의 주위에서 이 약 (또는 캡슐)를 개봉하는 것은 바람직하지 않습니다. Saccharomyces boulardii로 치료받지 않음에도 불구하고 중심정맥 카테터를 사용중인 환자들에게서 발열과 혈액 배양시 Saccharomyces 양성을 보이는 진균혈증에 매우 드물게 보고되어 왔습니다. 그러한 모든 경우에 항진균 치료를 하거나, 필요시 카테터를 제거하였을 때 만족할 만한 결과를 얻어 왔습니다.
- 자장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.