

파미딘®

일반의약품
파모티딘

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품의 분량】 1정 중

파모티딘(USP) 10mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 황색203호, 기타첨가제 : 무수인산수소칼슘, 스테아르산마그네슘, 오과드라이이늄색(83F61001), 유당수화물, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 연녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 신트림

【용법·용량】 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약의 성분 및 다른 H2 수용제 감형제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
 - 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
 - 3) 현기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
 - 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관(장자) 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
 - 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 9) 신장에(신장장애) 환자(혈중 뇨도가 증가될 수 있습니다.)
 - 10) 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있습니다.)
 - 11) 간장에 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
 - 12) 고령자(노인)
 - 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중증)의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.)
 - 14) 수유부(모유 중으로의 이행이 보고되어 있습니다.)
- 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무초치료제(이 약의 위산분비 억제작용이 아슬게 항진균(곰팡이)약(에, 이트라코나졸)의 경구흡수를 저하시킵니다.)
- 16) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않습니다.
 - 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- ① 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기),

두드러기 등

- ② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신권태감, 무력, 피로(피부 밑)점막하 출혈, 발열)
- ③ 피부 : 피부점막안증후군, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반(붉은 반점))
- ④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈·LDH 상승, 황달, 간염
- ⑤ 근육(뼈)격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련
- ⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면(얼굴)홍조, 이명(귀 울림)
- ⑦ 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 식욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
- ⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(인안염)
- ⑨ 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순
- ⑩ 호흡기(들숨)계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉(가슴)부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지정련
- ⑪ 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용합니다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 합니다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담합니다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 배합을 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따라 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용(섞어 씹어)되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

【포장단위】 10정

구입시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격인소 제품 (R=등록상표) I03



중 군 당

본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 8 (총정로3가)
공정 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
소비자상상담실 : 080-6776-080(수신자부담)



※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약물관련관리원(044-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부문서 작성일자(2019. 06. 05)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 민터넷 홈페이지(www.cckpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.

소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 | 한국소비자원