

프로톤 펌프 저해제

위란톤캡슐

(란소프라졸 30mg)

WUILANTON Cap.

위란톤캡슐은 소화성궤양 치료제로, 위궤양과 십이지장궤양에 우수한 치료효과를 나타내며, 결합부위가 많아 효과적으로 위산 분비를 억제해주는 역할을 합니다.

【약리작용】

Lansoprazole제제로서 위점막벽세포의 H⁺/K⁺ATPase를 억제함으로써 위산분비를 지속적으로 억제하여 위십이지장궤양, 역류성 식도염을 효과적으로 치료합니다. H.pylori 박멸에 유용한 제제, 24시간 동안 지속적으로 Heartburn을 억제, 뛰어난 안전성 등 기존의 PPI중에서 진일보한 제제로서 광범위하게 처방되고 있는 소화성 궤양치료제입니다.

【특징점】

- 1) 높은 생체내이용률
위란톤캡슐은 PPI중 생체이용률이 80%이상으로 높아 산분비를 빠르게 억제시킵니다.
- 2) 역류성식도염 치료효과
위란톤캡슐은 역류성식도염 치료제로 효과가 우수합니다.
- 3) 위십이지장궤양의 치료효과
위란톤캡슐은 NSAIDs 유발 위십이지장궤양의 치료에 효과적입니다.
- 4) 폭넓은 적응증
위란톤캡슐은 지방친화도가 높아 벽세포막을 신속히 확산된다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

란소프라졸과립(별규) 353mg
(란소프라졸로서 30mg)

【성 상】 백색-옅은 갈색의 과립을 충전한 상하 백색의 경질캡슐제

【효능·효과】

1. 활동성 십이지장궤양의 단기치료
2. 활동성 양성 위궤양의 단기치료
3. 십이지장궤양 재발방지를 위한 Helicobacter pylori의 박멸
4. 십이지장궤양의 치료 후 유지요법
5. 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 치료
6. 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소
7. 위식도 역류질환 관련 증상의 단기치료
8. 미란성 식도염의 단기치료
9. 미란성 식도염의 치료 후 유지요법
10. Zollinger Ellison 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태

【용법·용량】

〈성인〉

1) 약은 식전에 투여하여야 한다.

약을 삼키기 어려운 환자는 캡슐을 개봉하여 이 약을 소량의(60mL) 오렌지 주스 또는 토마토 주스에 넣어 섞은 후 즉시 투여한다.

약을 완전히 투여하기 위해 2배 또는 그 이상의 주스로 잔을 씻어서 즉시 마신다.

이 약을 개봉한 후 씹거나 부순 후 복용해서는 안 된다.

1. 활동성 십이지장 궤양의 단기치료 :

란소프라졸 15mg을 1일 1회 4주 동안 경구투여한다.

2. 활동성 양성 위궤양의 단기치료 :

란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여한다.

3. 십이지장궤양 재발방지를 위한 Helicobacter pylori의 박멸

① 란소프라졸 30mg을 클래리스로마이신 500mg, 아목시실린 1000mg과 함께 1일 2회(12시간마다) 7일간 또는 14일간 투여한다.

② 란소프라졸 30mg, 아목시실린 1000mg과 함께 1일 3회(8시간마다) 14일간 병용투여 한다.

4. 십이지장궤양의 치료 후 유지요법 :

란소프라졸 15mg을 1일 1회 경구투여한다. 비교시험은 12개월을 넘지 않았다.

5. 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 치료 :

란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여한다. 비교임상시험기간은 8주를 초과하지 않았다.

6. 비스테로이드성 소염진통제 유발성 위궤양의 발생위험 감소 :

란소프라졸 15mg을 1일 1회 12주 동안 경구투여한다. 비교임상시험 기간은 12주를 초과하지 않았다.

7. 미란성 식도염의 단기치료 :

란소프라졸 30mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여한다.

8. 미란성 식도염의 치료 후 유지요법 :

란소프라졸 15mg을 1일 1회 경구투여한다.

9. 위식도 역류 질환 관련 증상의 단기치료 :

란소프라졸 15mg을 1일 1회 8주 동안 경구투여한다.

10. Zollinger Ellison 증후군을 포함한 병리학적 과분비 상태 :

병리학적 과분비 상태에 따른 란소프라졸의 투약은 환자 개개인에 따라 다르다. 보통 성인에 60mg 1일 1회로 투약을 시작한다.

응량은 환자의 필요에 따라 조절되어야 하며 임상적으로 효과가 있는 한 계속 투여할 수 있다. 1회 90mg으로 1일 2회까지 투여되었다. 1일 120mg 이상 투여할 경우 분할하여 투여하여야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약물의 성분에 대한 과민반응 환자
- 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(H.pylori 박멸을 위해 아목시실린과 병용요법시)
- 3) 마크로라이드계 항생제 과민 환자
- 4) 심장이상 또는 전해질 장애 등으로 테르페나딘을 투약중인 환자(H.pylori 박멸을 위해 클래리스로마이신과 병용시에 한함.)
- 5) 아타자나비르 설페이트를 투약중인 환자(5. 상호작용 항 참조)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 약물과민증의 병력 환자
- 2) 간장애 환자(용량을 조절하여 투여해야 한다.)
- 3) 고령자
- 4) 임부, 수유부 및 소아

3. 이상반응

1) 중대한 이상반응

시판후 사용성적 조사 및 환자의 자발보고 등에서 나타난 중대한 이상반응은 다음과 같다.

① 아나필락시스 반응(전신발진, 안면부종, 호흡곤란 등)(0.1% 미만)이 발생되었고, 쇼크(0.1% 미만)를 유발할 예가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취해야 한다.

② 범혈구감소, 무과립구증, 용혈성 빈혈(0.1% 미만), 과립구감소, 혈소판감소, 빈혈(0.1~5%미만)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취해야 한다.

③ 황달, AST, ALT의 상승을 수반한 중독성 간기능장애(0.1% 미만)가 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취한다.

④ 중독성 표피괴사 반응(Lyell 증후군), 피부점막인 증후군(Stevens-Johnson 증후군)(0.1%)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상반응이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취해야 한다.

⑤ 간질성폐렴(0.1%미만)이 나타나는 경우가 있으므로 발열, 해수, 호흡곤란, 폐음의 이상(염발음(捻髮音)등)이 나타나는 경우에는 신속하게 흉부 X선 등의 검사 실시 및 이 약의 투여를 중지하고 부신피질호르몬제를 투여하는 등 적절한 조치를 취한다.

⑥ 간질성신장염이 나타날 수 있고, 때때로 급성신부전을 일으킬 수 있으므로, 신기능검사치(BUN, 크레아틴 상승 등)에 주의 하여 이상이 나타나는 경우 투여를 중지하고, 적절한 조치를 취한다.

⑦ H.pylori 박멸에 사용되는 아목시실린 또는 클래리스로마이신으로 위막성대장염과 같은 혈변을 동반한 심각한 대장염 (0.1% 미만)이 나타날 수 있다. 만약 복통과 잦은 설사 증상이 나타난다면 투약의 중지 등의 적절한 조치를 취해야 한다.

2) 임상시험에서 투동은 1% 이상에서 나타났으나 위약 투약군에서 더 자주 나타났다. 설사 발생율은 위약투약군, 란소프라졸 15mg, 30mg 투약군에서 발생율이 유사했지만 란소프라졸 60mg 투약군에서는 더 높았다. (각각 2.9%, 1.4%, 4.2% 및 7.4%) 유지기 시험동안 시험약 투여와 인과관계가 있는 것으로 생각되는 이상반응중 가장 많이 보고된 이상반응은 설사였다. 미국 및 다른 국가에서의 임상시험 또는 시판 후 보고된 이상반응은 1% 미만이며 다음과 같다.

- ① 전신 : 무력, 칸디다증, 흉통, 부종, 열, 플루증상(flu syndrome), 구취, 감염, 권태감
- ② 심혈관계 : 심중, 뇌혈관 사고, 고혈압/저혈압, 심근경색, 심계항진, 속크(소환부전), 혈관확장
- ③ 소화기계 : 식욕부진, 위식, 분문연축, 담석증, 변비, 구갈/갈증, 소화불량, 연하곤란, 트림, 식도협착, 식도궤양, 식도염, 대변 변색, 고창, 위결절/위저선 폴립, 위장염, 위십이지장 출혈, 토혈, 식욕증가, 타액 증가, 항문 출혈, 구내염, 이금후증, 궤양성 대장염, 구토, 구역, 설사

- ④ 내분비계 : 당뇨병, 갑상선증, 고지혈증/저지혈증
 ⑤ 혈액 및 림프계 : 빈혈, 출혈
 ⑥ 대사 및 영양 질환 : 통풍, 체중증가/감소
 ⑦ 근골격계 : 관절염/관절통, 근골격통, 근육통
 ⑧ 신경계 : 초조, 기악상실증, 불안, 무관심, 착란, 우울, 어지러움/실신, 환각, 편측마비, 적대감 악화, 성욕감퇴, 신경증, 감각이상, 비정상 사고
 ⑨ 순환기계 : 천식, 기관지염, 기침 증가, 호흡곤란, 비출혈, 객혈, 말초혈, 폐렴, 상기도감염
 ⑩ 피부 및 부속기관 : 여드름, 탈모, 가려움증, 발진, 두드러기
 ⑪ 특수 감각기관 : 시야흐림, 귀머거리, 안통, 중이염, 미각도착, 이명, 시야협착
 ⑫ 비뇨생식 기관 : 월경이상, 일부만뇨증, 가슴 확장/여성형 유방, 가슴압통, 당뇨(glycosuria), 혈뇨, 발기부전, 신결석
- 3) 시판 후 안전성 조사를 실시하고 있다. 아래에 기술된 대부분의 경우는 다른 원인에 의한 것으로 보이며 란소프라졸과의 인과관계에 대해서는 검증되지 않았다. 이러한 이상반응은 임의적으로 보고되므로 발생율을 알 수 없다.
- ① 전신 : 아나필락시양 반응
 ② 소화기계 : 간독성, 구토
 ③ 혈액 및 림프계 : 무과립구증, 재생불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 과립구감소증, 호중구감소증, 전혈구감소증, 혈소판감소증, 혈전성혈소판감소자반증
 ④ 특수 감각기관 : 언어장애(Speech disorder)
 ⑤ 비뇨생식기관 : 요저류
- 4) 국내 시판후 조사결과(조사종류수 : 897명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 복통
- 5) 아목시실린, 클레리스로마이신과 병용 투여
 란소프라졸, 아목시실린, 클레리스로마이신을 병용 투여한 임상시험에서 병용과 관련된 특별한 이상반응은 발견되지 않았다. 발생한 이상반응은 란소프라졸, 아목시실린, 클레리스로마이신과 관련하여 이전에 보고된 것과 같다.
- 3제 요법 : 란소프라졸, 아목시실린, 클레리스로마이신
 14일간 3제 요법을 받은 환자에서 가장 자주 나타난 이상반응은 설사(7%), 두통(6%), 미각도착(5%)이었다. 3제 요법 10일과 14일 사이에 나타난 이상반응 발생 빈도에서는 통계학적으로 유의한 차이가 없었다.
- 6) 실험실적 측정치
 다음의 실험실 검사치의 변화가 란소프라졸에 대한 이상반응으로 보고되었다.
 간기능검사 결과 이상, SGOT(ALT) 증가, SGPT(ALT) 증가, 크레아티닌 증가, ALP 증가, 글로불린 증가, GGTP 증가, WBC 증가/감소/이상, AG ratio 이상, RBC 이상, 빌리루빈혈증, 호산구증다증, 고지방혈증, 전해질 증가/감소, 클레스테롤 증가/감소, 글루코코르티코이드 증가, LDH 증가, 혈소판 증가/감소/이상, 가스빈증 농도 증가 등의 추가적인 실험실적 측정치의 이상이 발견되었다.
 위약 대조 실험에서 SGOT(ALT), SGPT(ALT)를 측정한 결과 위약 투여군에서 0.4% (1/250), 란소프라졸 투여군에서 0.3% (2/795)가 최종 방문에서 정상 범위를 상한보다 3배 이상 컸다. 시험기간 동안 환자에서 황달이 보고된 적은 없었다.
 단독투여한 경우에 비해 란소프라졸, 아목시실린, 클레리스로마이신을 복합 투여한 임상시험에서 실험실적 측정치가 특별히 증가한 경우는 없었다.
4. 일반적 주의
- 1) 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 치료상 필요한 최소 용량으로 투여하며, 위궤양, 문합부궤양에 사용하는 경우 장기간의 사용 경험은 충분하지 않으므로 유지요법에는 사용하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) H.pylori 박멸을 위해 클레리스로마이신, 아목시실린과 병용투여시 항생제의 투약정보를 참조해야 한다.
 ① 클레리스로마이신은 적당한 대체 치료법이 없는 경우를 제외하고는 임부에게 투여하여서는 안된다. 클레리스로마이신 복용 중 임신한 한 경우, 환자는 태아에 대한 잠재적 위험성을 알고 있어야 한다.
 ② 클레리스로마이신, 아목시실린 등 거의 모든 항생제에서 위막성 대장염이 보고되었으며 경증에서 생명을 위협하는 경우까지 그 정도가 다양하다. 따라서 항생제 투여후 설사를 나타내는 환자의 진단은 중요하다. 항생제 치료는 대장의 정상 세균총을 변경시키고 클로스트리디아의 과성장을 유도할 수 있다. 여러 연구에서 Clostridium difficile에 의해 생산된 독소가 항생제 관련 대장염의 주요 원인으로 나타났다. 위막성 대장염 진단후에는 치료를 시작해야 한다. 경증의 위막성 대장염은 약물 투여의 중지만으로 반응한다. 중증도 또는 중증의 경우 체액과 전해질 치료, 단백질 공급, Clostridium difficile 대장염에 대해 임상적으로 효과가 있는 항생제 치료가 고려된다. 심각하고 때로는 치명적인 과민반응(아나필락시)이 페니실린 치료중인 환자에서 보고되었다. 이러한 반응들은 페니실린 과민반응 병력을 가졌거나 여러 알러젠에 감수성을 갖는 사람에게 나타나기 쉽다. 세팔로스포린을 투여하였을 때 중증의 과민반응을 경험한 환자가 페니실린에 과민반응 병력을 가지고 있다는 많은 보고서가 있다. 페니실린으로 치료를 시작하기 전에 페니실린계 약물, 세팔로스포린계 약물 기타 알러젠에 과민반응이 있는지를 조사하여야 한다. 만약 과민반응이 일어난다면 아목시실린 투여가 중지되어야 하고 대체 치료가 고려되어야 한다. 중증의 아나필락시스 반응은 즉각적인 에피네프린, 산소, 스테로이드 정맥주 및 살관법을 포함한 기도유지 등의 응급치료가 필요하다.
- 3) 일부 해외 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료가 고관절, 손목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자화 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다.
5. 상호작용
- 1) 란소프라졸의 위산분비억제 작용은 아타나자비르 설페이트의 용해도를 낮추어 아타나자비르의 혈중 농도가 감소하여 아타나자비르 설페이트의 효과가 저하될 수 있기 때문에 아타나자비르 설페이트와의 병용투여를 금한다.
- 2) 유사제제(오메프라졸)가 디아제팜, 페니토인의 대사, 배설을 지연시킨다고 보고되었다.
- 3) 란소프라졸이 테오필린(CYP1A2, CYP3A) 병용 투여시 테오필린의 청소율이 10% 상승되는 것으로 나타났으므로 란소프라졸 투여를 시작 또는 종료시 임상적으로 유효한 혈중 농도를 확인하기 위해서는 각 환자는 테오필린 용량의 적당한 적정이 필요하다.
- 4) 란소프라졸은 타크롤리무스와 병용투여 시, 간의 약물대사효소에 의해 타크롤리무스의 대사를 경쟁적으로 저해하므로 란소프라졸 투여 시 타크롤리무스의 혈중농도가 증가할 수 있다.
- 5) 란소프라졸 30mg, 오메프라졸 20mg을 단독 또는 슈크랄라이트와 동시에 병용투여한 단회투여 교차시험 결과, 란소프라졸 및 오메프라졸의 흡수가 지연되었으며 생체이용률이 각각 17%, 16% 감소하였다. 따라서 프로톤 펌프 억제제를 슈크랄라이트보다 30분 앞서 투여해야 한다.
- 6) 란소프라졸은 현저하고 오랫동안 지속되는 위산 분비 억제제를 나타내므로 란소프라졸은 위산의 pH가 생체이용률에 중요한 인자인 약물(예, Ketoconazole, itraconazole, ampicillin esters, iron salts, digoxin, methylidigoxin, gefitinib)의 흡수에 영향을 미칠 수 있다.
- 7) 란소프라졸을 포함한 프로톤 펌프 억제제와 와파린을 동시에 투여받은 환자에서 INR(International Normalized Ratio)과 프로트롬빈 시간이 증가했다는 보고가 있다. INR과 프로트롬빈시간의 증가는 비정상적인 출혈뿐만 아니라 사망까지도 야기할 수 있으므로 프로톤 펌프 억제제와 와파린을 동시에 투여받는 환자는 INR과 프로트롬빈시간 증가에 대한 모니터링이 필요할 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 캣트에 있어서 태자의 혈장중 농도는 모동물의 혈장중농도보다 높다고 인정되었다. 또한, 토끼(경구 30mg/kg)에서 태자사망율의 증가가 인정되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.
7. 소아에 대한 투여
- 1) 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다.)
8. 고령자에 대한 투여
 일반적으로 고령자에서는 위산분비기능이 저하되어 있으며 기타 다른 생리기능이 저하되어 있으므로 저용량으로 투여를 시작하는 등 신중히 투여한다.
9. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
 3) 쉽게 부서질 수 있으므로 자동분포기사용은 적절하지 않다.
10. 기타
- 1) 캣트(50mg/kg/일)에게 52주간 강제 경구투여한 실험(임상용량의 약100배)의 1예에서 양성의 정소 간세포종이, 24개월간 강제 경구 투여한 실험(15mg/kg/일)의 암컷 1예에서 위의 카르티노이드 종양이 인정되었다는 보고가 있다. 또한 암컷 캣트에 15mg/kg/일 이상 및 수컷 캣트에 50mg/kg/일 이상 투여군에서 망막위축발생빈도의 증가가 확인되었다. 정소세포종 및 망막위축증은 마우스의 발암성 시험, 해 원숭이의 독성시험에서는 확인되지 않았으며 캣트에서의 특이한 변화일 수 있다.
- 2) 이 약의 투여가 위함에 따른 증상을 은폐할 수 있으므로 악성이 아님을 확인하고 투여해야 한다.
- 3) 오메프라졸 주사제에 의해 외국에서 시력장애가 발현되었다는 보고가 있다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

제조의회사 : 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : 유니메드제약(주) 충청남도 아산시 실옥로 110-27

설명서 작성일 120822