

뇌기능 개선 및 혈액순환의 치료

# 징코로민 정 120mg (은행엽엑스)

분류번호 : 219

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

은행엽엑스(생규) ..... 120mg

(총고콜라본배당체로서 28.8mg)

첨가제(동물유래) : 유당수화물(건강한 젖소, 우유)

첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크

## 【성 상】

녹색의 원형 필름코팅정

## 【효능·효과】

### 1. 주 효능효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

## 【용법·용량】

### 1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림):  
은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)
- 2) 기질성 뇌기능 장애:  
은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다.(복용한다.)
2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 부작용

드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의  
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여  
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여  
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항  
직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

**【저장방법】**

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**【사용기간】**

제조일로부터 36개월

**【포장단위】**

240정(120 PTP \* 2)

- \* 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.
- \* 의약품을 사용하시기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조사

 **Arlico**  
알리코제약|주|  
충북 진천군 광혜원면 용소2길 21  
<http://www.arlico.co.kr>

〈설명서작성년월〉13. 04)  
(M01)

제조의회 · 판매자

 **명문제약주식회사**  
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26  
[www.mmpharm.co.kr](http://www.mmpharm.co.kr)