



액상형 종합감기약

하벤[®] Q₁₀ 연질캡슐

「일반의약품」

분류번호 114

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP)	200mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
수도에페드린염산염(USP)	15mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	8mg
구아니페네신(KP)	41.6mg

■ 성상 : 미황색(연노랑)의 투명한 내용물을 함유한 노란색 투명한 타원형 연질캡슐제

■ 효능·효과 : 감기의 증상상(여러증상)콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

■ 용법·용량

- 만 15세 이상 및 성인 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 1일 3회, 1회 1½캡슐 식후 30분에 복용
- 만 7세 초과 ~ 만 11세 미만 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

■ 사용상의 주의사항

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용 하면 간 손상이 유발될 수 있다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
진해기침을 그치게 할 거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)코염용 경구제, 말미암, 알레르기 약물
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구도를 수반하는 행동의 변화가 있거나, 드물지만 심각한 질병인 레아증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성비염, 기관지 천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 5) 간질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 간상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눌곤란 등)이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 (당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐결핵, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부정(부기), 배뇨(소변을 눌곤란, 목마름(지속적)이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한증상) 증상이 나타난 경우
 ① 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부정(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피파괴증(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 ③ 천식
 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 ⑤ 간질성비염: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
 3) 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독 하에 복용시킬 것.
 4) 복용 시에는 음주하지 말 것.
 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관 할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관 (사용기간: 제조일로부터 24개월)

■ 포장단위 : 10캡슐

■ 제조의뢰자 : 고려제약주식회사

■ 제조자 : (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2013년 12월 30일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

14-7-24

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실
080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10