

코·알레르기성 비염
제네프린
나зал 액
(페닐레프린염산염)

일반의약품
분류번호: 01320

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

- 유효성분 : 페닐레프린염산염(USP) 5mg
- 첨가제(보존제) : 벤질코늄염화물 0.2mg
- 기타 첨가제 : 에데트산나트륨수화물, 인산수소나트륨수화물, 인산이소나트륨, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌 글리콜400, 프로필렌글리콜

【성 상】 무색 내지 미황색(연노랑)의 투명한 액제

【효능 및 효과】


코감기(급성비염(급성코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법 및 용량】

- 성인 : 1회 2번씩 비강(코안)내에 분무한다(뿌린다). 3시간 이상의 투여 간격을 두며 1일 6회를 넘지 않도록 한다.
- 만7세 이상~만15세 미만 소아 : 1회 1번씩 비강(코안)내에 분무한다(뿌린다). 3시간 이상의 투여 간격을 두며 1일 6회를 넘지 않도록 한다.

■ 제품 사용방법

1. 뚜껑을 씌운채로 용기를 충분히 흔들어 주십시오.
2. 최초 사용시 뚜껑과 누액방지용 안전판(흰색)을 제거 한 후 그림과 같이 용기를 잡고 힘있게 눌러 균일한 분무가 이루어지도록 5~6회 시험분무 하십시오.
3. 머리를 약간 숙인 후, 한쪽 코를 막은 상태에서 용기의 끝을 다른쪽 코안에 넣고 지시된 투여 횟수만큼 분무한 후 숨을 가볍게 들이마십시오. 반대쪽도 같은 방법으로 분무한 후 숨을 가볍게 들이마십시오.
4. 사용 후 뚜껑을 닫고 용기는 똑바로 세운 상태로 보관하십시오. 지시된 횟수 이상으로 사용하지 마십시오.



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 만 7세 미만의 유아
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약(비염(코염)용 분무제(뿌리는 제품) 포함)에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

코·알레르기성 비염
제네프린
나зал 액
(페닐레프린염산염)

**JENE
PHRINE
NASAL** Soln.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제(뿌리는 제품)로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
- 6) 사용 시에는 음주하지 말 것.
- 7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

【포장단위】 30mL

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 태극제약(주) 충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

【제조외리자】 제이에스제약(주) 전라남도 장성군 황룡면 강변로 484-28

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

JNP02-E01-04

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 16

제조사
태극제약(주)
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

제조의외자
제이에스제약(주)
전남 장성군 황룡면 강변로 484-28
소비자상담전화 : 061) 394-5530