일반의약품



【성 상】 회청미석의 타원형 필름코팅정

【원료약품의 분량】 - 1정 중 -

탄산칼슘 98%과립(별규) ····· 1,579mg (칼슘으로서 600mg)
농축콜레칼시페롤(분말형)(BP) ····· 5mg (콜레칼시페롤로서 500IU)
무수황산제이구리(USP) ····· 1.26mg (구리로서 0.5mg)
산화아연(USP) ····· 9.34mg (아연으로서 7.5mg)
산화마그네슘(USP) ····· 82.9mg (마그네슘으로서 50mg)
황산망간수화물(USP) ····· 5.39mg (망간으로서 1.75mg)
첨가제 (타르색소) : 황색 5호, 적색 40호, 청색 1호

【효능·효과】 1) 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급 2) 다음 경우의 비타민 D의 보급: 임신·수유기, 발육기, 노년기 3) 이 약에 함유된 비타민 D(콜레칼시페롤)의 효능·효과는 다음과 같습니다: 뼈, 이의 발육 불량, 구루병의 예방

【용법·용량】 성인 1회 1정씩 1일 1~2회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 고칼슘혈증(hypercalciumia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 윌슨병 5) 신장결석 환자 6) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 플루오로퀴놀론계 항생제, 레보티록신(갑상선의약품)을 투여중이거나 최근 투여받은 경우.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 혀칼을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이(에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오. 3) 임부 및 임신하고 있는 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아: 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다. 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 강심배당체를 투여중인 환자 8) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자 10) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있는 경우: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진 상복부통증, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 폐부종, 복부팽만, 복부통증, 트림, 위장재내공기참, 고칼슘뇨증, 신결석증 2)대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 올혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다. 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 5) 우발적으로 과량 복용한 경우: 다음과 같은 증상이 과다복용에 의해 나타날 수 있습니다: 구역, 구토 등의 위장증상, 변비, 알칼리혈증, 식욕부진, 고칼슘혈증, 저인산혈증, 우유알칼리증후군 등의 대사장애 장애 및 신결석, 고나트륨혈증, 올혈성 심부전, 부종(부기) 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【사 용 기 한】 외부포장을 참조하십시오.

【저 장 방 법】 밀폐용기, 실온보관

【포 장 단 위】 60정, 120정 (60정 X 2개)

소비자 상담 전화: 080-002-2727

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 거쳤으나, 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr)의 의약품 정보를 참조하세요.

®등록상표

설경서 작성년월일 2013년 5월 1일
Kit310

수입·판매원
Pfizer
한국화이자제약
서울시 중구 퇴계로 110

- 제조의뢰자: Pfizer Australia Pty Ltd, 38-42 Wharf Road. Westryde NSW. 2114 Australia
- 제조자: Made by Wyeth Pharmaceutical Co Ltd, 4 Baodai West Road, Suzhou, Jiangsu Province 215128, China