



염증성 안질환 치료 및 충혈제거제

플루페스트 점안액

(Flufast Eye Drops)

전문의약품
분류번호 01310

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

주 성 분: 플루오로메톨론(USP)	1.00mg
주 성 분: 테트라히드로졸린염산염(KP)	0.25mg
안 정 제: 에데트산나트륨수화물(KP)	0.50mg
안 정 제: 폴리소르베이트80(KP)	0.50mg
보 존 제: 벤잘코늄염화물액10%(KP)	0.50mg

그외성분: 포비돈, 염화나트륨, 붕산, 붕사, 주사용수

【성 상】

무색 투명한 병에 든 무색 내지 미황색의 현탁액

【효능·효과】

1. 심한 충창과 혈관내 충혈이 있는 급성 비감염성 결막염, 알레르기성 각막염
2. 전안부의 비감염성 염증(전포도막염, 상공막염, 공막염)
3. 사시절개술 및 백내장, 녹내장 수술 후 염증

【용법·용량】

1회 1방울, 1일 2~3회 결막낭 내에 점안한다.
성인의 경우 처음 24~48시간 동안은 1시간마다 1방울씩 점안할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람에게는 사용하지 말 것.
 - 1) 이 약 성분에 과민증 환자
 - 2) 임부, 수유부
 - 3) 감염성 각막염·결막염 환자
 - 4) 녹내장 환자
 - 5) 건성안 환자(특히 쇼그렌 증후군 환자)
 - 6) 각막손상 및 각막결양, 단순포진성 바이러스 및 기타 바이러스 감염, 세균감염, 진균감염환자
 - 7) 2세 이하의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 관상동맥심질환, 고혈압, 크론치화세포증 등 중증의 혈액순환장애 환자
 - 2) 갑상선 기능항진증, 당뇨병 등 대사성 장애 환자
 - 3) MAO억제제 또는 고혈압 유발 가능성이 있는 약물을 투여중인 환자
 - 4) 백내장, 단순포진 감염의 병력이 있는 환자
 - 5) 건조성 비염 환자
 - 6) 유·소아
3. 부작용
 - 1) 적용직후 잠깐 동안 치료에는 영향을 주지 않는 완화된 자극증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 장기간 사용할 때 안압상승이 유발될 수 있으므로 정기적으로 안압검사를 실시한다.
 - 3) 장기간 사용할 때 반응성 충혈이 유발될 수 있다.
 - 4) 안경 습진형태의 알레르기반응, 점상각막염, 눈주위의 피부염이 드물게 보고되었다.
 - 5) 부신피질호르몬제 장기투여에 따른 백내장 및 각막결손이 유발될 수 있다.
 - 6) 안구조직에 진균에 의한 2차 감염이 일어날 수 있다.(특히 진균감염증, 단순포진성 감염증)
 - 7) 상처치유의 지연, 산동, 아주 드물게 건선, 안구출혈, 영양성 각막손상이 1주일간의 치료 후에 나타날 수 있다.
 - 8) 후낭하 백내장, 각막의 박막화, 안구천공이 일어날 수 있다.
 - 9) 장기간 사용할 때(특히 소아의 경우) 두통 및 불면 같은 전신적 부작용을 초래할 수 있다.