

마이믹스 정

MYMIX Tablet

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

파리독신염산염(KP)	20.0mg
시아노코발라민(KP)	0.3mg
아스코르브산과립(KPC)	206.2mg (아스코르브산으로서 200mg)
판토텐산칼슘(KP)	30.0mg
산화마그네슘(KP)	100.0mg (마그네슘으로서 60mg)
황산아연수화물(KP)	10.0mg (아연으로서 2.27mg)
농축콜레칼시페롤(BP)	3.0mg (콜레칼시페롤로서 300IU)
첨가제(타르색소):이스프레이적색(GMIEKR16) 중 황색5호 알루미늄 레이크, 적색40호 알루미늄레이크	

【성상】

적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민(D, B₆, C)의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다.
 - 비타민D(농축콜레칼시페롤) 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

- 비타민B₆(파리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입술코리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 비타민C(아스코르브산과립)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소 침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸 출혈·비출혈(코피) 예방

○ 아연의 보급

【용법·용량】

8세이상 어린이 및 성인 : 1일 3회, 1회 1정씩 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장(콩팥)결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

- 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 : 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 심장순환기계기능 장애환자
 - 6) 신장(콩팥)장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자
 - 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 10) 임부
 - 11) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 구토
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 4) 물산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토, 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기), 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으

- 킬 수 있으므로 주의할 것
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

60, 300 정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

작성월 : 2013. 05.

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

EJ3403-01

주식회사 휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100
100, Baiobaelli-ro, Jecheon-si,
Chungcheongbuk-do, Korea

Huons