일반의약품

코엔자임Q10과 감마오리자놀 함유 항산화제

큐텐시스 연질캡슐


無 타르색소

분류번호: 319(기타의 비타민제)

[성분·함량] 1캡슐 중

아스코르브산(KP)	500mg
토코페롤(USP)	90.909mg (비타민E로서 100IU)
리보플라빈(KP)	12mg
유비데카레논(KP)	10mg
β-카로틴현탁액30%(KPC)	10mg (β-카로틴으로서 3mg)
셀레늄함유건조효모(별규)	38.462mg (셀레늄으로서 50μg)
γ-오리자놀(KPC)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg

[성 상] 적색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐



[효능·효과]

◎ 다음 경우의 비타민 A, E, B2, B6, C의 보급

– 육체피로, 임신수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기

– 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같습니다.

· 비타민A(β-카로틴현탁액30%) : 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

· 비타민B2(리보플라빈): 다음 증상의 완화 – 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 비타민C(아스코르브산): 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

· 비타민E(토코페롤): 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 – 어깨뭉결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용



※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

※ 그림과 같이 캡슐포장의 볼록한 부분을 화살표방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이 때 실수로 알루미늄포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

[사용상의주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2)의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
6) 심장·순환기계기능 장애 환자
7) 신장(콩팥)장애 환자
8) 저단백혈증 환자
9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있습니다.
8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
9) 우발적으로 과량복용한 경우
10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에게 투여 할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
7) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합시시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

[사용기한] 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호, 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.

예) 제조번호 #2001, 사용기한 2015년 1월 6일인 경우 →"2001, 2015.01.06"로 표시

[포장단위] 120캡슐 (60캡슐×2)

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 제품설명서의 최근개정된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 : www.yuhan.co.kr 소비자상담실 : 080-024-1188(수신자 요금부담)

문안작성년월일 2013. 5. 22
사용기한은 외부포장에 표기

제조의뢰·판매원
유한양행
본사:서울특별시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청원군 오창읍 연구단지로 29

제조원
(주)알피코프
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7