



일반의약품

생약성분

월경전증후군 치료제

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.

【작용·특성】

프리메린은 월경(생리)전 증후군(Premenstrual syndrome: PMS)의 치료에 널리 사용되고 있습니다.

프리메린의 도파민성 물질은 프로락틴의 생성을 억제시켜 다양한 월경전 증후군의 증상을 개선시켜줍니다.

월경전 증후군은 여러 신체적, 정서적 증상들의 복합체가 생리주기에 따라 반복적, 주기적으로 나타나는 질환으로 주로 배란 후 황체기에 이러한 증상들이 나타났다가 생리 시작 직전이나 그 직후 없어집니다.

월경전 증후군의 증상으로는 신경과민, 과민성 감정굴곡, 피증스려움, 우울 등 전서적 증상과 두통, 미루증상, 가슴팽창, 이빨바 통증, 피로, 수면장애 등 신체적 증상이 있습니다.

【원료약품의 분량】에 관한

아그누스카스투스엘메60%에탄올엑스(6-12 개) · 엘로이그양이산화구소혼합물(1:1)(별 구) 40mg
(아그누스카스투스엘메60%에탄올엑스(6-12 개)로서 20mg)

【성상】

원색 원형의 양면이 볼록한 필름코팅정제입니다.

【효능·효과】

월경전증후군(PMS)으로 인한 두통, 피부증상, 가슴팽창, 아랫배 통증, 신경과민, 과민성 감정굴곡, 피증스려움, 우울, 피로, 수면장애 등의 신체적 및 정신적 증상의 치료

【용법·용량】

1일 1회, 1회 1정 식사후 상온수에 복용하십시오.

효능이 발현(드러남)되기 위해 적어도 3일간 지속적으로 복용하는 것이 좋습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락타아제 결핍(lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 복용하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오

- 임신 기간 동안에는 성가치 없으므로 피 낙을 복용할 필요가 없습니다.
- 이 약의 오용 중으로의 이행 여부는 알려지지 않았으나 수유부는 복용하지 않는 것이 바람직합니다. 또한 부득이하게 복용하는 경우에는 수유를 중단해야 합니다.
- 이 약의 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 다른 질병이 있는 환자
에스트로겐-민감성 암환자, 노후수체선에서 프로락틴을 분비하는 암환자, 뇌하수체 장애의 전력이 있는 환자
- 알레르기가 있는 환자
- 다른 약을 복용하고 있는 환자
도파민 효능제 및 도파민 길항제(의제제)

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 이 약의 투여에 의해 이상반응이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의해야 합니다.
현재까지 관찰된 이상반응은 다음과 같습니다.
· 열감부종(부기), 호흡곤란, 현기증(삼킴곤란) 등 알레르기 반응
· 피부반응(피진 및 두드러기)
· 두통, 어지럼증
· 소화장애(구토, 복통(배앓음))
· 여드름
· 월경의 빈도나 양의 변화
소수의 경우 치료 초기에 월경전증후군이 악화되어 발생할 수 있습니다.
- 월경 주기의 어긋남이 항상되지 않거나 더 악화되는 불편함이 있다면 의사와 상의해야 합니다.
- 이 약은 경구피임제를 복용하는 환자를 포함한 다수의 임상시험에서 비복용군과의 차이는 없었습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (일회용) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【주의】

- 개봉 후에는 타제품과 혼입 및 혼용(섞어쓰기) 되지 않도록 주의하십시오.
- 제품 개봉시 또는 취급시 포자지(용기, 케이스)에 상처를 입힐 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】

기밀봉기에 넣어 실온(1-30℃)에 보관하십시오.

【포장단위】

30, 50정

※구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격인증 제품

상=통독상표

제조자:

zeller Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse
4, D-4504 Romanshorn, 스위스

수입자:

충 군 당

본사: 서울특별시 서대문구 홍성로 8 (충정로 2가
공정: 충남 천안시 서북구 상서로 10-4
구입처: 서울특별시 서대문구 홍성로 8 (충정로 2가)
구입처: 서울특별시 서대문구 홍성로 8 (충정로 2가)

이 첨부서 작성일자 (2015.5.5) 이후 변경된 내용은 증권당 홈페이지(www.ckdpharm.com)나
소비자 상담전화(080-6778-030)를 통해 확인할 수 있습니다.

Made in Switzerland zeller