

무좀·각질·가려움을 한번에

피엠트리플크림

PM Triple Cream

일반의약품

분류번호:265

사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

무좀은 곰팡이의 일종인 백선균이 피부각질층에 기생하여 발생하는 가장 흔한 피부진균(곰팡이)감염증으로 수포(물집), 농포(고름물집), 가려움증, 통증 등 참기 어려운 다양한 증상을 수반하는 질환입니다. 심한 경우 각화(각질화)증 및 인설(비늘, 깍질) 등이 나타나기도 하는 만성적이고 재발적인 소양(가려움)성 질환입니다.

피엠트리플크림은 무좀균의 세포막 형성을 억제하여 진균자체를 죽이는 살진균 작용을 나타내는 테르비나핀염산염(Terbinafine HCl)에 각질 연화 작용이 있는 우레아의 함유로 약물 침투성이 증대되어 기존 약물로는 효과를 보지 못했던 각화(각질화)형 무좀에 우수한 효과를 나타냅니다. 또한 크로타미톤, 에녹솔론, 멘톨을 함유하여 가려움증, 염증완화 효과와 청량감을 주어 각질 및 가려움증을 동반한 무좀 증상을 효과적으로 개선시켜 줍니다.

● **원료약품 및 그 분량 : 1g 중**

테르비나핀염산염(EP)	10mg
우레아(KP)	50mg
크로타미톤(USP)	50mg
L-멘톨(KP)	20mg
에녹솔론(BP)	5mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

● **성 상 : 흰색의 크림제**

● **효능 · 효과**

피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

● **용법 · 용량**

1일 1회, 적당량을 환부(질환 부위)에 도포한다(바른다).

● **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.



경남제약|주|
Kyung Nam Pharm.,Co.,Ltd.

4. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

- 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것**
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람
 - 3) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 4) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
 - 5) 환부(질환 부위)가 화농(괴음)으로 되어 있는 사람
 - 6) “습진”인지 “무좀, 완선(사타구니백선), 백선” 인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다)

6. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것
 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

2) 2주일 정도 사용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

- 7. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항**
- 1) 정해진 용법 및 용량을 엄수할 것
 - 2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것
 - 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
 - 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것
 - 5) 이 약은 외용에만 사용할 것
 - 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

- 8. 저장상의 주의사항**
- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
 - 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다)
 - 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것(품질유지를 위해)

- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)
- **제조사** : **성광제약**(주) 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47
- **제조외자** : **경남제약**(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

- ※ 기타 주의
1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
 3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
- 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관「<http://drug.mfds.go.kr>」→「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.