

순환장애 개선제
칼리닌 50단위
(칼리디노게나제)

칼리닌정 50단위(칼리디노게나제)는 건강한 돼지의 췌장(이자)에서 추출한 칼리디노게나제를 성분으로 하는 순환장애 개선제입니다. 칼리디노게나제는 1908년 I.E.Abelous가 뇨 중에서 감압물질을 발견한 것이 계기가 되어 치료제로 개발된 것으로 이후 그 유효성과 안전성이 인정되어 오늘날까지 임상에 널리 응용되어 올으로써 가장 긴 life cycle을 가진 약물중 하나가 되었습니다. 칼리디노게나제는 생체내의 혈액, 뇨, 체장, 타액(침), 타액선, 땀, 눈물, 뇌척수액 등에 널리 분포되어 있는 생체 고유의 고단백 분해 효소로서 혈장중의 α_2 -globulin분획 중에 존재하는 kininogen에 작용하여 kinin을 유리시킵니다. 이 kinin은 말초혈관 확장 및 미소순환 속도의 향진에 기인한 혈액 증가작용 및 조직대사개선작용을 발휘하므로 고혈압증, 협심증을 비롯하여 메니에르 증후군, 갱년기·초초기의 순환계 장애 질환에 우수한 효과를 나타냅니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

칼리디노게나제(JP) 50 I.U.

첨가제(동물유래) : 칼리디노게나제(돼지췌장(이자)), 무수유당.

[성 상]

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법 · 용량]

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여한다(복용한다). 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중(머리무거움), 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
3. 고령자(노인)에 대한 투여
일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30정, 100정, 300정, 500정

[제 조 자] (주)일화 - 경기도 구리시 안골로56번길 25

[제조외뢰자] 한국셀슨제약(주) - 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서를 약과 함께 보관 하십시오.
- ※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2013. 06. 20